

対象疾患	大腸癌
プロトコール名	FOLFIRI + Bevacizumab
投与計画	<p>           アバスチン 5mg/kg , d1            レボホリナート 200mg/m<sup>2</sup> , d1            オキサリプラチン 85mg/m<sup>2</sup> , d1            イリノテカン 180mg/m<sup>2</sup> , d1            5-FU 急速 400mg/m<sup>2</sup> , d1            5-FU 持続 2400mg/m<sup>2</sup> , d1         </p> <p>インターバル 2週</p> <p>Day1</p> <p>①グラニセトロン3mg/バック+デキサート(6.6mg) 1.5V 30分</p> <p>②アバスチン5mg/kg または 10mg/kg + 生食100ml 初回90分、2回目60分、3回目以降30分</p> <p>③イリノテカン150mg/m<sup>2</sup> + 5%糖液250ml 90分</p> <p>④レボホリナート200mg/m<sup>2</sup> + 生食250ml ③と同時に2時間</p> <p>⑤フルオウラシル400mg/m<sup>2</sup> + 生食50ml 全開で</p> <p>⑥フルオウラシル2400mg/m<sup>2</sup> + 生食 (全量100mlとする) 46hrかけて</p> <p>副作用予防            デカドロン4mg 1回1錠 1日2回 朝・昼食後 2日目から3日目まで内服</p>