

対象疾患	胆道・胆道癌							
プロトコール名	S1単独療法							
投与計画	<p>S1 BSA1.25㎡未満 80mg/日 BSA1.25～1.5㎡未満 100mg/日 BSA1.5㎡以上 120mg/日 4投2休 ※術後補助療法の場合の投与期間は半年間</p>							
	<p><腎機能障害時の投与変更例></p> <table border="1" data-bbox="571 743 1690 965"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 743 817 853">Ccr(ml/mim) ≥80</th> <th data-bbox="817 743 1182 853">60～80</th> <th data-bbox="1182 743 1452 853">30～60</th> <th data-bbox="1452 743 1690 853"><30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 853 817 965">減量なし</td> <td data-bbox="817 853 1182 965">初回投与量 (必要に応じて1段階減量)</td> <td data-bbox="1182 853 1452 965">1段階以上の減量</td> <td data-bbox="1452 853 1690 965">投与不可</td> </tr> </tbody> </table>	Ccr(ml/mim) ≥80	60～80	30～60	<30	減量なし	初回投与量 (必要に応じて1段階減量)	1段階以上の減量
Ccr(ml/mim) ≥80	60～80	30～60	<30					
減量なし	初回投与量 (必要に応じて1段階減量)	1段階以上の減量	投与不可					