対象疾患	膵癌
プロトコール名	FOLFIRINOX療法
投与計画	レボホリナート 200mg/m², d1 オキサリプラチン 85mg/m³, d1 イリノテカン 180mg/m³, d1 5-FU 急速 400mg/m³, d1 5-FU 持続 2400mg/m³, d1  インターパル 2週  Day1 ①グラニセトロン3mgパック + デキサート(6.6mg) 1.5V 30分 ②オキサリプラチン85mg/m³ + 5%糖液250ml 2時間 ③レボホリナート200mg/m³ + 5%糖液250ml 2時間 ④イリノテカン180mg/m³ + 生食250ml ②終了後 2時間 ⑥フルオロウラシル400mg/m³ + 生食50ml 全開で ⑥フルオロウラシル400mg/m³ + 生食(全量100mlとする) 46hrかけて 副作用予防 イメンドカプセル125mg 1回 1CP エルプラット投与1時間~1時間30分前に内服 イメンドカプセル80mg 1回 1CP エルプラット投与1時間~1時間30分前に内服 イメンドカプセル80mg 1回 1CP 1日1回朝食後 2日目から3日目まで内服 デカドロン4mg 1回1錠 1日2回 朝・昼食後 2日目から4日目まで内服 デカドロン4mg 1回1錠 1日2回 朝・昼食後 2日目から4日目まで内服 「カドロン4mg 1回1錠 1日2回 朝・昼食後 2日目から4日目まで内服 「カドロン4mg 1回5mg/m³ 180mg/m³ 400mg/m³ 2400mg/m³ 2400mg/m³ 200mg/m³ 1200mg/m³ 1200m
	Level 3   中止   中止   中止