

DCS(S1・CDDP・DOC)併用療法

【投与計画】

S-1 80mg/body Day1 夕食後より内服開始(2週間服用し2週間休薬する)
 (BSA1.25m²未満 80mg/日、1.25m²以上1.5m²未満 100mg/日、1.5m²以上 120mg/日)
 ドセタキセル 35mg/m² Day1、15
 シスプラチニン 35mg/m² Day1、15
 インターバル:4週

Day 1、15

	薬品名	投与量	投与経路	
①	パロノセトロン点滴静注バッグ アロカリス デキサート	0.75mg/50ml 235mg 1V 6.6mg 1.5V [9.9mg]	点滴静注	120ml/hr 30分かけて投与
②	生食	100ml	点滴静注	
③	生食	500ml	点滴静注	500ml/hr
④	ドセタキセル 生食	35mg/m ² 250ml	点滴静注	250ml/hr
⑤	生食 静注用マグネゾール	500ml 0.5A	点滴静注	500ml/hr
⑥	生食 フロセミド	50ml 20mg 1A	点滴静注	250ml/hr
⑦	シスプラチニン 生食	35mg/m ² 500ml	点滴静注	250ml/hr
⑧	ソルデム3A	500ml	点滴静注	250ml/hr
⑨	ビカネイト	500ml × 2本	点滴静注	120ml/hr
⑩	ソルデム3A	500ml × 2本	点滴静注	120ml/hr

Day 2、16

	薬品名	投与量	投与経路	
⑨	ビカネイト	500ml	点滴静注	120ml/hr
⑩	ソルデム3A	500ml	点滴静注	120ml/hr

■制吐剤処方

デカドロン4mg 1回 1錠 1日2回 朝・昼食後 3日分(2~4日目に内服)

オランザピン錠OD錠2.5mg 1回 2錠 1日1回 夕食後 3日分(治療当日から4日間服用)