

## RAM+nab-PTX併用療法(ラムシルマブ+アブラキサン)

## 【投与計画】

サイラムザ 8mg/kg Day1、15  
 アブラキサン 100mg/m<sup>2</sup> Day1、8、15  
 インターバル:4週

## Day 1、15

	薬品名	投与量	投与経路	
①	生食	100ml	点滴静注	
②	レスタミンコーワ	5錠(50mg)	経口	③と同時に ※レスタミン禁忌[抗コリン作用による悪化の為]⇒オロパタジン錠5mg
③	生食 デキサート	50ml 6.6mg 1V	点滴静注	200ml/hr(15分)
④	生食	50ml		ルートフラッシュ用
⑤	サイラムザ 生食	8mg/kg 250ml	点滴静注	250ml/hr(60分) 初回60分かけて投与、2回目以降30分まで短縮可能(忍容性評価)
⑥	アブラキサン 生食	100mg/m <sup>2</sup> 30ml	点滴静注	30分かけて ※1Vあたり生食20mlで溶解

## Day 8

	薬品名	投与量	投与経路	
①	生食 デキサート	50ml 6.6mg 1V	点滴静注	200ml/hr(15分)
②	生食	100ml		
③	アブラキサン 生食	100mg/m <sup>2</sup> 30ml	点滴静注	30分かけて ※1Vあたり生食20mlで溶解