

ビロイ+XELOX

【投与計画】

ビロイ 初回 $800\text{mg}/\text{m}^2$ day1
2回目以降 $600\text{mg}/\text{m}^2$ day1

ゼロータ $3000\text{mg}/\text{日}$ (1日2回 1回 5錠) Day1夕食後～Day15朝食後まで
オキサリプラチニン $130\text{mg}/\text{m}^2$ day1
インターバル:3週

Day1

	薬品名	投与量	投与経路	
①	生食	100ml	点滴静注	
	[処置薬] オランザピンOD	2.5mg 2錠	経口	
②	ポララミン注 生食	5mg 50ml	点滴静注	200ml/hr
③	パロノセトロン点滴静注バッグ アロカリス デキサート	0.75mg/50ml 235mg 1V 6.6mg 1.5V [9.9mg]	点滴静注	120ml/hr
④	生食	50ml	点滴静注	ルートフラッシュ用
⑤	初回 ビロイ 生食	800mg/ m^2 ml 総点滴量560ml	点滴静注	
	2回目以降 ビロイ 生食	600mg/ m^2 ml 総点滴量420ml	点滴静注	
⑥	5%糖液	100ml	点滴静注	
⑦	オキサリプラチニン 5%糖液	130mg/ m^2 500ml	点滴静注	250ml/hr

内服薬

ゼロータ 300mg 10錠/日 1日2回 朝・夕食後 14日間内服し1週間休薬する
デカドロン4mg 1回1錠 1日2回 朝・昼食後 3日分(2~4日目に内服)
オランザピン錠OD錠2.5mg 1回2錠 1日1回 夕食後 3日分(2~4日目に内服)