

## PAM+PTX併用療法(ラムシルマブ+パクリタキセル)

## 【投与計画】

サイラムザ 8mg/kg Day1、15  
 パクリタキセル 80mg/m<sup>2</sup> Day1、8、15  
 インターバル:4週

## Day 1、15

	薬品名	投与量	投与経路	投与日
①	生食 デキサート ファモチジン注	50ml 6.6mg 1A 20mg 1A	点滴静注	200ml/hr(15分)
	レスタミンコーウ錠	5錠(50mg)	経口	①と同時に ※レスタミン禁忌[抗コリン作用による 悪化の為]⇒オロパタジン錠5mg
②	生食	100ml		
③	サイラムザ 生食	8mg/kg 250ml	点滴静注	250ml/hr(60分)
④	パクリタキセル 生食	80mg/m <sup>2</sup> 250ml	点滴静注	250ml/hr(60分)

## Day 8

	薬品名	投与量	投与経路	投与日
①	生食 デキサート ファモチジン注	50ml 6.6mg 1A 20mg 1A	点滴静注	200ml/hr(15分)
	レスタミンコーウ錠	5錠(50mg)	経口	①と同時に ※レスタミン禁忌[抗コリン作用による 悪化の為]⇒オロパタジン錠5mg
②	生食	100ml		
③	パクリタキセル 生食	80mg/m <sup>2</sup> 250ml	点滴静注	250ml/hr(60分)