

CBDCA+VP-16+アテゾリズマブ

【投与計画】

テセントリク 1200mg/body、d1
 カルボプラチナ AUC=5(カルバートの式:AUC × (GFR+25)にて計算)
 エトポシド 100mg/body、d1-3
 インターバル:3週

Day1

	薬品名	投与量	投与経路	
①	パロノセトロン点滴静注バッグ アロカリス デキサート	0.75mg/50ml 235mg 1V 6.6mg 1.5V [9.9mg]	点滴静注	120ml/hr 30分かけて投与
②	生食	100ml	点滴静注	
③	生食	50ml	点滴静注	テセントリク投与後に ルートフラッシュ
④	テセントリク 生食	1200mg/body 250ml	点滴静注	初回60分、忍容性あれば2回目以降30分まで 短縮可
⑤	カルボプラチナ 生食	AUC5 250ml	点滴静注	250ml/hr
⑥	エトポシド 5%糖液	80mg/m ² 500ml	点滴静注	330ml/hr(90分で)

Day2,3

	薬品名	投与量	投与経路	
①	生食	100ml	点滴静注	
②	エトポシド 5%糖液	80mg/m ² 500ml	点滴静注	330ml/hr(90分で)

内服薬(CBDCA+VP-16療法時)

デカドロン錠4mg 1日2回 朝・昼食後 1回1錠 (d2-4)