

CBDCA+VP-16+アテゾリズマブ

テセントリク 1200mg/body、d1

カルボプラチン $AUC=5$ (カルバートの式: $AUC \times (GFR+25)$ にて計算)

エトポシド 100mg/m²、d1-3

インターバル: 3週

4コース終了後、増悪を認めなければアテゾリズマブ単剤投与(1200mg/回、3週毎)を継続

Day1

	薬品名	投与量	投与経路	
①	パロノセトロン点滴静注バッグ アロカリス デキサート	0.75mg/50ml 235mg 1V 9.9 mg	点滴静注	120ml/hr 30分かけて投与
②	生食	100ml	点滴静注	
③	生食	50ml	点滴静注	テセントリク投与後に ルートフラッシュ
④	テセントリク 生食	1200mg/body 250ml	点滴静注	初回60分、忍容性あれば2回目以降30分まで 短縮可
⑤	カルボプラチン 生食	AUC5 250ml	点滴静注	250ml/hr
⑥	エトポシド 5%糖液	100mg/m ² 500ml	点滴静注	330ml/hr(90分で)

Day2,3

	薬品名	投与量	投与経路	
①	生食	100ml	点滴静注	
②	エトポシド 5%糖液	100mg/m ² 500ml	点滴静注	330ml/hr(90分で)