

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
1 抗菌薬	0.2%ミノマイ軟膏(院内約束製剤)	通常採用
1 抗菌薬	3%クリンダマイシン軟膏(院内約束製剤)	通常採用
1 抗菌薬	アザクナム注射用1g	通常採用
1 抗菌薬	アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」	通常採用
1 抗菌薬	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」 2mL	通常採用
1 抗菌薬	アンスルマイシン静注用1.5g	通常採用
1 抗菌薬	エザンブートル錠 250mg	通常採用
1 抗菌薬	エリスロシト ライシロップ 10% (100mg/g)	通常採用
1 抗菌薬	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」	通常採用
1 抗菌薬	エルタシン注60mg	通常採用
1 抗菌薬	オーグメンチン配合錠250RS 375mg	通常採用
1 抗菌薬	カママイシンカプセル250mg「明治」	通常採用
1 抗菌薬	クラビキット錠250mg (レボフロキサシとして)	通常採用
1 抗菌薬	クラビキット錠500mg	通常採用
1 抗菌薬	クラフォラン注射用1g	通常採用
1 抗菌薬	クラリスト ライシロップ 10%小児用(100mg/g)	通常採用
1 抗菌薬	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	通常採用
1 抗菌薬	クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」	通常採用
1 抗菌薬	クリンダマイシン酸エステル注射液600mg「サワイ」	通常採用
1 抗菌薬	ケフラル細粒小児用 (100mg/g)	通常採用
1 抗菌薬	ザイボックス錠600mg	通常採用
1 抗菌薬	ザイボックス注射液600mg 300mL	通常採用
1 抗菌薬	ジエニナック錠200mg	通常採用
1 抗菌薬	ジスロマック錠 250mg	通常採用
1 抗菌薬	ジフロキサシン点滴静注液300mg「NP」 150mL	通常採用
1 抗菌薬	スルバクシン静注用0.75g	通常採用
1 抗菌薬	セファゾリンNa注射用1g「タイヨー」	通常採用
1 抗菌薬	セファピコール静注用1g	通常採用
1 抗菌薬	セフトセフ静注用1g	通常採用
1 抗菌薬	セフトン細粒小児用10%(100mg/g)	通常採用
1 抗菌薬	セフェニルカプセル100mg	通常採用
1 抗菌薬	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	通常採用
1 抗菌薬	ゾシン静注用 2.25g	通常採用
1 抗菌薬	ゾシン静注用4.5 4.5g	通常採用
1 抗菌薬	ゾラチール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm	通常採用
1 抗菌薬	タイベラシリン注射用1g	通常採用
1 抗菌薬	タイベラシリン注射用2g	通常採用
1 抗菌薬	タラシカプセル150mg	通常採用
1 抗菌薬	チエム点滴静注用0.5g 500mg	通常採用
1 抗菌薬	テイクラン点滴静注用200mg「タイヨー」	通常採用
1 抗菌薬	トブラシン注60mg	通常採用
1 抗菌薬	バクテ配合錠	通常採用
1 抗菌薬	バクタミン注 5mL	通常採用
1 抗菌薬	バクタミン配合顆粒	通常採用
1 抗菌薬	バセトシン細粒10% 100mg	通常採用
1 抗菌薬	バセトシン錠 250mg	通常採用
1 抗菌薬	ビクシリン注射用1g	通常採用
1 抗菌薬	ビトラ錠「オーツカ」 50mg	通常採用
1 抗菌薬	ビラマイド 原末	通常採用
1 抗菌薬	フルマリン静注用1g	通常採用
1 抗菌薬	ホスミンS静注用1g	通常採用
1 抗菌薬	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」	通常採用
1 抗菌薬	ミノトワ錠100 100mg	通常採用
1 抗菌薬	メロベム点滴静注用0.25g「明治」 250mg	通常採用
1 抗菌薬	メロベム点滴静注用0.5g「明治」 500mg	通常採用
1 抗菌薬	メロベム点滴用バクタミン0.5g 500mg	通常採用
1 抗菌薬	モベラシン静注用1g	通常採用
1 抗菌薬	ユガシン-Sキット静注用3g (生理食塩液100mL付)	通常採用
1 抗菌薬	リアソフィン静注用1g	通常採用
1 抗菌薬	リファンピシカプセル150mg「サント」	通常採用
1 抗菌薬	塩酸バンコマイシン散0.5g「マイラン」 500mg	通常採用
1 抗菌薬	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」	通常採用
1 抗菌薬	塩酸バンコマイシン点滴静注用1g「マイラン」	通常採用
1 抗菌薬	注射用ベンシリンGカリウム100万単位	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
2	抗ウイルス薬・抗ウイルス療法薬	アキオス錠400 400mg	通常採用
2	抗ウイルス薬・抗ウイルス療法薬	アキオス点滴静注用250mg	通常採用
2	抗ウイルス薬・抗ウイルス療法薬	イビ [®] ル吸入粉末剤20mg	通常採用
2	抗ウイルス薬・抗ウイルス療法薬	カイト [®] 配合錠	通常採用
2	抗ウイルス薬・抗ウイルス療法薬	タミフルカプセル 75mg	通常採用
2	抗ウイルス薬・抗ウイルス療法薬	ツルハ [®] タ [®] 配合錠	通常採用
2	抗ウイルス薬・抗ウイルス療法薬	ハ [®] ルトレックス錠500 500mg	通常採用
2	抗ウイルス薬・抗ウイルス療法薬	ヒ [®] タ [®] ラビ [®] ン軟膏3%「タイヨ-」 (5g/本)	通常採用
2	抗ウイルス薬・抗ウイルス療法薬	フラジ [®] ール内服錠250mg	通常採用
2	抗ウイルス薬・抗ウイルス療法薬	ラビ [®] アタ点滴静注液パ [®] ック [®] 300mg 60mL	通常採用
2	抗ウイルス薬・抗ウイルス療法薬	リレンザ [®] 5mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
3	抗真菌薬	イトラコナゾール錠50「MEEK」 50mg	通常採用
3	抗真菌薬	エンペシトクリーム1% (10g/本)	通常採用
3	抗真菌薬	ビホソールクリーム1%「タイヨ」 (10g/本)	通常採用
3	抗真菌薬	ビホソール外用液1%「タイヨ」 (10ml/本)	通常採用
3	抗真菌薬	ファンカート点滴用50mg	通常採用
3	抗真菌薬	ファンキゾンシロップ 100mg/mL	通常採用
3	抗真菌薬	ブイフェント 200mg 静注用	通常採用
3	抗真菌薬	ブイフェント 錠50mg	通常採用
3	抗真菌薬	フルカート 静注液200mg 0.2%100mL	通常採用
3	抗真菌薬	フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」	通常採用
3	抗真菌薬	フロリートDクリーム1% (10g/本)	通常採用
3	抗真菌薬	ヘナバックス注用300mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名		正式名称	採用形態
4	抗寄生虫薬	ストロメクトール錠 3mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
5	予防接種用薬	インフルエンザ ワクチン(1ml/V)	通常採用
5	予防接種用薬	ツベルクリン注「一般」 (0.25 μ g/瓶)	通常採用
5	予防接種用薬	ニューモバックスNP 0.5mL	通常採用
5	予防接種用薬	ヘプタバックス II 0.5mL	通常採用
5	予防接種用薬	一般診断用精製ツベルクリン(PPD) 1 μ g(溶解液付)	通常採用
5	予防接種用薬	沈降破傷風トキソイド 0.5mL	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
6 消毒薬	0.02%オキシゲンリゼリン（院内約束製剤）	院内採用
6 消毒薬	0.02%ヒソテン液1ml（約束製剤）	院内採用
6 消毒薬	0.02%サール液（約束製剤）	院内採用
6 消毒薬	0.05%ヒソテン液1ml（約束製剤）	院内採用
6 消毒薬	0.05%サール液（約束製剤）	院内採用
6 消毒薬	0.1%ヒソテン液1ml（約束製剤）	院内採用
6 消毒薬	0.1%サール液（約束製剤）	院内採用
6 消毒薬	0.5%ヒソテンアルコール内約束製剤	院内採用
6 消毒薬	2%ハイポアルコール「ヤクハン」	通常採用
6 消毒薬	70%消毒用イソプロパノール「ニコー」	通常採用
6 消毒薬	アクリノール消毒液0.1%「NP」	通常採用
6 消毒薬	オールカット液5%	通常採用
6 消毒薬	オキシール	通常採用
6 消毒薬	ネグミンゲル10%（90g/本）	通常採用
6 消毒薬	ホビラール消毒液10%	通常採用
6 消毒薬	液状フェノール	通常採用
6 消毒薬	塩化ベンザルコニウム液 10%	通常採用
6 消毒薬	複方ヨート・クセリン（健栄）	通常採用
6 消毒薬	無水エタノール「ヒヤマ」（10ml/A）	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
7 抗悪性腫瘍薬	5-FU錠50協和 50mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	5-FU注1,000mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	5-FU注250協和 250mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ア-ビ`タックス注射液100mg 20mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	アケテムう点滴静注用200mg 10mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	アケテムう点滴静注用400mg 20mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	アケテムう点滴静注用80mg 4mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	アクブ`ラ静注用100mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	アクブ`ラ静注用10mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	アクブ`ラ静注用50mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	アド`リアシン注用10 10mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	アバ`スチン点滴静注用100mg/4mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	アバ`スチン点滴静注用400mg/16mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	アブ`ラキサン点滴静注用100mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	アリミテ`ックス錠1mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	アリムタ注射用100mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	アリムタ注射用500mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	アルケラン錠2mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	アロマン錠25mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	イレッサ錠 250mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	エト`ルビ`シン塩酸塩注射用10mg「NK」	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	エト`ルビ`シン塩酸塩注射用50mg「NK」	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	エルブ`ラット点滴静注用100mg 20mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	エルブ`ラット点滴静注用50mg 10mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	エンド`キサン錠50mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	オンコビ`ン注射用1mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	カゾテ`ックス錠80mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	カルボ`フ`ラチン点滴静注用150mg「NK」15mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	カルボ`フ`ラチン点滴静注用450mg「NK」	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	カルボ`フ`ラチン点滴静注用50mg「NK」5mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	カンブ`ト点滴静注100mg 5mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	カンブ`ト点滴静注40mg 2mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	グ`リハ`ック錠100mg	患者限定採用
7 抗悪性腫瘍薬	クレチン細粒 (1g/包)【後発変更不可】	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ゲ`ムシタビ`ン点滴静注用1g「ヤクルト」	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ゲ`ムシタビ`ン点滴静注用200mg「ヤクルト」	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	シスブ`ラチン点滴静注用10mg「マイラン」 20mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	シスブ`ラチン点滴静注用50mg「マイラン」 100mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ゼ`ロータ`錠 300mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ゾ`ラテ`ックス3.6mgテ`ホ`	患者限定採用
7 抗悪性腫瘍薬	タキソテル点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付)	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	タキソテル点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	タオミン錠10mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	タオミン錠20mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	タルセバ`錠100mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	タルセバ`錠150mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ティーエスワン配合カブ`セルT20 20mg(テカ`フル相当量)	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ティーエスワン配合カブ`セルT25 25mg(テカ`フル相当量)	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ティーエスワン配合顆粒T20 20mg(テカ`フル相当量)	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ティーエスワン配合顆粒T25 25mg(テカ`フル相当量)	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ナベ`ルビ`ン注10 10mg1mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ナベ`ルビ`ン注40 40mg4mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ネクスバ`ール錠200mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ハーセブ`チン注射用150 150mg(溶解液、希釈液付)	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ハーセブ`チン注射用60 60mg(溶解液、希釈液付)	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ハイド`レアカブ`セル 500mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ハ`クリタキセル注100mg「マイラン」 16.7mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ハ`クリタキセル注30mg「マイラン」 5mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ヒ`シバ`ニール注射用5KE (溶解液付)	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ヒスロンH錠200mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	フェアストン錠40 40mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	フェアストン錠60 60mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	フェソロテ`ックス筋注250mg 5mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	フェマーラ錠2.5mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	フルツロンカブ`セル 200mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ブ`レオ注射用5mg	通常採用

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
7 抗悪性腫瘍薬	ペクテビックス点滴静注100mg 5mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ペクテビックス点滴静注400mg 20mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ペフシド注100mg 5mL	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ペフセラ錠10 10mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	マイマイシン注用2mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ユーフティE配合顆粒T100 100mg (テカフル相当量)	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ユーフティE配合カプセルT100 100mg (テカフル相当量)	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ユーゼル錠 25mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	リュプリンSR注射用キット 11. 25mg	患者限定採用
7 抗悪性腫瘍薬	リュプリン注射用キット3. 75 3. 75mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	レボネリナート点滴静注用100mg「ヤルト」	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	レボネリナート点滴静注用25mg「ヤルト」	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	リンチン静注用1mg「味の素」	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ロイゲリン散10%	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	ロイゲリン散10%	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	注射用エンドキサン500mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	注射用サイクリン100mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	注射用サイクリン50mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	注射用フィルテシン1mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	注射用フィルテシン3mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	注射用メソトレキセート50mg	通常採用
7 抗悪性腫瘍薬	動注用アイエーコル100mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
8	免疫抑制薬	イムラン錠50mg	通常採用
8	免疫抑制薬	ネオ-ラル10mgカプセル	通常採用
8	免疫抑制薬	ネオ-ラル25mgカプセル	通常採用
8	免疫抑制薬	ネオ-ラル50mgカプセル	通常採用
8	免疫抑制薬	フﾟレﾟイニン錠 50mg	通常採用
8	免疫抑制薬	フﾟロﾟラフカﾟセル0.5mg	通常採用
8	免疫抑制薬	フﾟロﾟラフカﾟセル1mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
9 副腎皮質ステロイド*	アンテート軟膏0.05% (10g/本)	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	ケコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	コートリル錠10mg	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	コハクサン注射用10mg	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	サクシゾン静注用500mg (溶解液付)	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	ソル・コステフ注射用100mg (溶解液付)	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	デカドロン錠0.5mg	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	デキサート注射液1.65mg 0.5mL	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	デルモゾールGクリーム (5g/本)	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	デルモゾールG軟膏 (5g/本)	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	デルモゾールローション0.12% (10mL/本)	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	プレトニゾン散「タケ」1% 10mg/g	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	フレロン錠1mg	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	フレロン錠5mg	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	フロリネド錠0.1mg (mg入力)	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	マイザークリーム0.05% (5g/本)	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	マイザーク軟膏0.05% (100g/瓶)	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	マイザーク軟膏0.05% (5g/本)	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	リメタゾン静注2.5mg 1mL	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	リンデロン坐剤1.0mg	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	リンデロン注4mg (0.4%)	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	ロイトクリーム0.1% (5g/本)	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	注射用ソル・メルコート125 125mg (溶解液付)	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	注射用ソル・メルコート40 40mg (溶解液付)	通常採用
9 副腎皮質ステロイド*	注射用ソル・メルコート500 500mg (溶解液付)	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	PL配合顆粒 (1g/包)	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	SG配合顆粒 (1g/包)	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	アセトアミノフェン	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「TYK」	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	アセトアミノフェン錠200mg (TYK)	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	インテパ [®] ンクリーム1% (25g/本)	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	カロナール錠200 200mg	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	カロナール錠300 300mg	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	クリノール錠 100mg	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	ジ [®] クロフェナクナトリウム坐剤25mg「タハ [®] 」	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	ジ [®] クロフェナクナトリウム坐剤50mg「タハ [®] 」	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	スミルスチック3% (40g/本)	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	スミロ [®] -ジョン3% (60ml/本)	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	セラステ [®] -フ [®] 70 (10cm×14cm/10枚/袋)	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	セレコックス錠100mg	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	セレコックス錠200mg	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	ソレルモンSRカプ [®] セル37.5mg	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	ナキサン錠100mg	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	ノイトロビ [®] ン錠4単位	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	ノイトロビ [®] ン注射液3.6単位 3mL	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	ハ [®] テルテープ 20 (7cm×10cm/7枚/袋)	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	ハ [®] テルテープ 40 (10cm×14cm/7枚/袋)	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	ホ [®] ルタレンSRカプ [®] セル37.5mg ★患者希望の為	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	ホ [®] ルタレンゲ [®] ル1% (25g/本)	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	メチロン注25% 1mL	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	メロキシカム錠10mg「NP」	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	モ [®] -ラステ [®] -フ [®] 20mg (7cm×10cm/7枚/袋)	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	モ [®] -ラステ [®] -フ [®] L40mg (10cm×14cm/7枚/袋)	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	モ [®] -ラステ [®] -フ [®] 30mg (10cm×14cm/7枚/袋)	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	ヤクハ [®] ンテープ 40mg (10cm×14cm/7枚/袋)	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	ロキソ [®] プロフェナクナトリウム錠60mg「タイヨ [®] 」	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	ロビ [®] オン静注50mg 5mL	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	ロルカム錠 4mg	通常採用
10	非ステロイド [*] 抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬	幼児用PL配合顆粒 (1g/包)	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
11	抗リウマチ薬	アザルフィドン錠250mg	通常採用
11	抗リウマチ薬	アダントデイスホ 関節注25mg 1%2.5mL	通常採用
11	抗リウマチ薬	エンブレル皮下注25mgシリンジ 0.5mL	通常採用
11	抗リウマチ薬	サリゾスルファヒリジン腸溶錠500mg「日医工」	通常採用
11	抗リウマチ薬	シホニール皮下注50mgシリンジ 0.5mL	通常採用
11	抗リウマチ薬	スベニールデイスホ 関節注25mg 1%2.5mL	通常採用
11	抗リウマチ薬	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ 0.8mL	通常採用
11	抗リウマチ薬	ファルネゾンゲル1.4% (25g/本)	通常採用
11	抗リウマチ薬	メトレート錠2mg	通常採用
11	抗リウマチ薬	モーバール錠100mg	患者限定採用
11	抗リウマチ薬	リウマトレックスカプセル 2mg	通常採用
11	抗リウマチ薬	リトール錠3mg	通常採用
11	抗リウマチ薬	リマチル錠 100mg	通常採用
11	抗リウマチ薬	リマチル錠 50mg	通常採用
11	抗リウマチ薬	レミケート 点滴静注用100 100mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
12	消炎酵素	カ ⁺ スチ ⁻ ム 20,000単位	通常採用
12	消炎酵素	ブ ⁺ ロメ ⁻ ライ ^ン 軟膏5万単位/g(シ ⁺ ェ ⁻ イト ^ル 7) 50,000単位 (20g/本)	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
13	抗ヒスタミン薬	セレスタミン配合錠	通常採用
13	抗ヒスタミン薬	ピ [®] レチア錠 (25mg)	通常採用
13	抗ヒスタミン薬	ハ [®] リアクチンシロップ [®] 0.04%	通常採用
13	抗ヒスタミン薬	ハ [®] リアクチン散1% (10mg/g)	通常採用
13	抗ヒスタミン薬	ハ [®] リアクチン錠4mg	通常採用
13	抗ヒスタミン薬	ホ [®] ララミン注5mg	通常採用
13	抗ヒスタミン薬	レスタミンコーワクリーム1%	通常採用
13	抗ヒスタミン薬	レスタミンコーワ錠10mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
14	抗アレルギー薬	アイビ [®] -デ [®] -イカフ [®] セル 100mg	通常採用
14	抗アレルギー薬	アレク [®] ラ錠60mg	通常採用
14	抗アレルギー薬	エビ [®] ナジ [®] オン錠10 10mg	通常採用
14	抗アレルギー薬	エビ [®] ナジ [®] オン錠20 20mg	通常採用
14	抗アレルギー薬	シ [®] ルテック錠 10mg	通常採用
14	抗アレルギー薬	シンク [®] レア錠10mg	通常採用
14	抗アレルギー薬	セ [®] スラン錠3mg	通常採用
14	抗アレルギー薬	トラニラストカフ [®] セル100mg「タイヨ-」	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
15 糖尿病治療薬	アカルホー-スOD錠100mg「マイラン」	通常採用
15 糖尿病治療薬	アカルホー-スOD錠50mg「マイラン」	通常採用
15 糖尿病治療薬	アカルホー-ス錠100mg「サワイ」	通常採用
15 糖尿病治療薬	アピトラ注カート 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	アピトラ注ヨロスター 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	イノレット30R注 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	エカ錠50mg	通常採用
15 糖尿病治療薬	キネダック錠50mg	通常採用
15 糖尿病治療薬	グラクティフ錠100mg	通常採用
15 糖尿病治療薬	グラクティフ錠25mg	通常採用
15 糖尿病治療薬	グラクティフ錠50mg	通常採用
15 糖尿病治療薬	グリラジト錠20mg「NP」	通常採用
15 糖尿病治療薬	グリラジト錠40mg「NP」	通常採用
15 糖尿病治療薬	グリミット錠0.5mg「サント」	通常採用
15 糖尿病治療薬	グリミット錠1mg「サント」	通常採用
15 糖尿病治療薬	グリミット錠3mg「サント」	通常採用
15 糖尿病治療薬	グルヘース配合錠	通常採用
15 糖尿病治療薬	スターシス錠 30mg	通常採用
15 糖尿病治療薬	スターシス錠 90mg	通常採用
15 糖尿病治療薬	タムセル錠1.25mg	通常採用
15 糖尿病治療薬	タムセル錠2.5mg	通常採用
15 糖尿病治療薬	トラゼンタ錠5mg	通常採用
15 糖尿病治療薬	トレシーバ注 フレックスタッチ 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	トレシーバ注 ペンフィル 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ネシーナ錠12.5mg	通常採用
15 糖尿病治療薬	ネシーナ錠25mg	通常採用
15 糖尿病治療薬	ネシーナ錠6.25mg	通常採用
15 糖尿病治療薬	ノボラピット30ミックス注 ペンフィル 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ノボラピット30ミックス注フレックスペン300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ノボラピット50ミックス注 フレックスペン 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ノボラピット70ミックス注 フレックスペン 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ノボラピット注 イノレット 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ノボラピット注 フレックスペン 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ノボラピット注 ペンフィル 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ノボリン30R注フレックスペン 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ノボリン注フレックスペン 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ノボリンR注 100単位/mL (10mL/V)	通常採用
15 糖尿病治療薬	ノボリンR注フレックスペン 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ハイエッタ皮下注10μg ^g ン300 300μg (10μg)	通常採用
15 糖尿病治療薬	ハイエッタ皮下注5μg ^g ン300 300μg (5μg)	通常採用
15 糖尿病治療薬	ヒオグリラゾン錠15mg「タハ」	通常採用
15 糖尿病治療薬	ヒオグリラゾン錠30mg「タハ」	通常採用
15 糖尿病治療薬	ヒートザ 皮下注18mg 3mL	通常採用
15 糖尿病治療薬	ヒューマログN注カート 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ヒューマログN注ミリオペン 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ヒューマログミックス50注カート 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ヒューマログミックス50注ミリオペン 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ヒューマログ注カート 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ヒューマログ注ミリオペン 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ブドウ糖 (10g/包)	通常採用
15 糖尿病治療薬	ホグーリホー-スOD錠0.3mg「タイヨ」	通常採用
15 糖尿病治療薬	メタクト配合錠HD	通常採用
15 糖尿病治療薬	メタクト配合錠LD	通常採用
15 糖尿病治療薬	メット錠 250mg	通常採用
15 糖尿病治療薬	メトグルコ錠250mg	通常採用
15 糖尿病治療薬	ランタス注カート 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	ランタス注ヨロスター 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	レベミル注 イノレット 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	レベミル注 フレックスペン 300単位	通常採用
15 糖尿病治療薬	レベミル注 ペンフィル 300単位	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
16	高脂血症治療薬	アトルバ [®] スタチン錠10mg「KN」	通常採用
16	高脂血症治療薬	アトルバ [®] スタチン錠5mg「KN」	通常採用
16	高脂血症治療薬	クレストール錠2.5mg	通常採用
16	高脂血症治療薬	クレストール錠5mg	通常採用
16	高脂血症治療薬	コレハ [®] イン錠 500mg	通常採用
16	高脂血症治療薬	ゼ [®] チア錠10mg	通常採用
16	高脂血症治療薬	フ [®] ラバ [®] スタチンNa塩錠10mg「KH」	通常採用
16	高脂血症治療薬	フ [®] ロフ [®] コル錠250mg「トーワ」	通常採用
16	高脂血症治療薬	ヘ [®] ザ [®] テートSR錠200 200mg	通常採用
16	高脂血症治療薬	ヘ [®] リット錠 125mg	通常採用
16	高脂血症治療薬	リハ [®] ロ錠1mg	通常採用
16	高脂血症治療薬	リハ [®] ロ錠2mg	通常採用
16	高脂血症治療薬	リヒ [®] テ [®] イル錠80mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
17	痛風・抗尿酸血症治療薬	アロプリノール錠100mg	通常採用
17	痛風・抗尿酸血症治療薬	アロプリノール錠50mg「杏林」	通常採用
17	痛風・抗尿酸血症治療薬	コルヒチン錠0.5mg「タカ」	通常採用
17	痛風・抗尿酸血症治療薬	フェブリック錠10mg	通常採用
17	痛風・抗尿酸血症治療薬	フェブリック錠20mg	通常採用
17	痛風・抗尿酸血症治療薬	フェブリック錠40mg	通常採用
17	痛風・抗尿酸血症治療薬	ユリノール錠 25mg	通常採用
17	痛風・抗尿酸血症治療薬	ラスリテック点滴静注用7.5mg(溶解液付)	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
18 女性ホルモン剤	エルゴ [®] トリンマレイン酸塩注0.2mg「F」 0.02%1mL	通常採用
18 女性ホルモン剤	プロスタール錠25 25mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
20	他のホルモン剤	ケルカゴニンG/ホ 注射用1mg（溶解液付）	通常採用
20	他のホルモン剤	サント スタチンLAR筋注用10mg（溶解液付）	通常採用
20	他のホルモン剤	サント スタチンLAR筋注用30mg（溶解液付）	通常採用
20	他のホルモン剤	サント スタチン皮下注用100 μ g 1mL	通常採用
20	他のホルモン剤	サント スタチン皮下注用50 μ g 1mL	通常採用
20	他のホルモン剤	セリン ストOD錠5mg	通常採用
20	他のホルモン剤	デ スモフ レシン・スプ レ-2.5協和 125 μ g	院外患者限定
20	他のホルモン剤	ヒ トリン注射液20 20単位	通常採用
20	他のホルモン剤	ヨウレン錠「100」 100 μ g	通常採用
20	他のホルモン剤	ヨウ化カリウム「ヨシダ」	通常採用
20	他のホルモン剤	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	通常採用
20	他のホルモン剤	レグ ハ 錠25mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
21	甲状腺疾患治療薬	チラーチン錠 100 μ g	通常採用
21	甲状腺疾患治療薬	チラーチン錠 25 μ g	通常採用
21	甲状腺疾患治療薬	チラーチン錠 50 μ g	通常採用
21	甲状腺疾患治療薬	内服用ルコール液(院内約束手製剤)	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
22	骨・カルシウム代謝薬	レ-アスハ [®] ラギ [®] ン酸Ca錠200mg「サワイ」	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	アレント [®] ロン酸錠35mg「マイラン」	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	アレント [®] ロン酸錠5mg「マイラン」	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	エスカトニール筋注20単位 (20エルカトニンU/1mL)	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	エテ [®] イロ-ルカフ [®] セル0. 5 μ g	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	エテ [®] イロ-ルカフ [®] セル0. 75 μ g	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	エビ [®] スタ錠60mg	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	エルシトニン注20S 20エルカトニン単位1mL	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	オキサロール注 2. 5 μ g 1mL	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	オキサロール注 5 μ g 1mL	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	オキサロール注10 μ g 1mL	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	カルチコール注射液8. 5%5mL	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	ゾ [®] メタ点滴静注用4mg 5mL	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	テ [®] イ-アルファカフ [®] セル 0. 25 μ g	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	テ [®] イ-アルファカフ [®] セル 0. 5 μ g	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	テ [®] イ-アルファカフ [®] セル 1 μ g	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	テリボ [®] ン皮下注用56. 5 μ g	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	フォルテオ皮下注キット600 μ g	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	メナトトレノンカフ [®] セル15mg「TYK」	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	ランマーク皮下注120mg 1. 7mL	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	リカルボ [®] ン錠1mg	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	リカルボ [®] ン錠50mg	通常採用
22	骨・カルシウム代謝薬	乳酸カルシウム水和物「ヨシタ [®] 」	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
23 ビタミン製剤	50mgアリナミン糖衣錠	通常採用
23 ビタミン製剤	アスコルビン酸注「シ-タック注25%」	通常採用
23 ビタミン製剤	アリナミンF25注	通常採用
23 ビタミン製剤	エルカルチンFF静注1000mg 1,000mg5mL	通常採用
23 ビタミン製剤	ケイツ-N静注10mg	通常採用
23 ビタミン製剤	ハイシ-顆粒25% (1g/包)	通常採用
23 ビタミン製剤	ハ-ンテニール注100mg	通常採用
23 ビタミン製剤	ハ-ントシン散20% (1g/包)	通常採用
23 ビタミン製剤	ビ-オチン散0.2%「フソー」	通常採用
23 ビタミン製剤	ビ-タシ-ェクト注キット 2筒	通常採用
23 ビタミン製剤	ビ-タノイリンカフ-セル 25	通常採用
23 ビタミン製剤	ビ-タミNB6錠30mg「F」	通常採用
23 ビタミン製剤	フォリアミン錠 5mg	通常採用
23 ビタミン製剤	フォリアミン注射液	通常採用
23 ビタミン製剤	フラビ-タン錠 10mg	通常採用
23 ビタミン製剤	メコハ-ラムミン錠500「ト-ワ」 0.5mg	通常採用
23 ビタミン製剤	メチコハ-ール注射液500μg 0.5mg	通常採用
23 ビタミン製剤	ユベ-ラナカフ-セル100mg	通常採用
23 ビタミン製剤	ユベ-ラ軟膏	通常採用
23 ビタミン製剤	リメファ-3B注射液 10mL	通常採用
23 ビタミン製剤	ワッサ-V配合顆粒 (1g/包)	通常採用
23 ビタミン製剤	調剤用ハ-ンビ-タン末	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
24 輸液・栄養製剤	5%糖液キットH 100ml	通常採用
24 輸液・栄養製剤	KCL注20mEqキット「テルモ」 1㍻L20mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ア-ガ [®] メイト20%㍻ [®] リ-25g	通常採用
24 輸液・栄養製剤	アスパ [®] ラリウム注10mEq 17.12%10mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	アミカリック輸液 500mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	アミノレバ [®] ンEN配合散 (50g/袋)	通常採用
24 輸液・栄養製剤	アミノレバ [®] ン点滴静注 500mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	アミュー配合顆粒 2.5g	通常採用
24 輸液・栄養製剤	アルスロマチック関節手術用灌流液 3L	通常採用
24 輸液・栄養製剤	イントラボ [®] ス輸液20% 100mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	エルネオハ [®] 【1号】輸液 1000mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	エルネオハ [®] 2号輸液 1000mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	エレタル配合内用剤 (80g/袋)	通常採用
24 輸液・栄養製剤	エレタル配合内用剤(㍻ [®] トル) (80g/本)	通常採用
24 輸液・栄養製剤	エンジュア [®] ・H コーヒー味 (250ml/缶)	通常採用
24 輸液・栄養製剤	エンジュア [®] ・リキッド [®] イチゴ [®] 味 (250ml/缶)	通常採用
24 輸液・栄養製剤	エンジュア [®] ・リキッド [®] コーヒー味 (250ml/缶)	通常採用
24 輸液・栄養製剤	エンジュア [®] ・リキッド [®] ハニース [®] 味 (250ml/缶)	通常採用
24 輸液・栄養製剤	カミバ [®] ック生理食塩液L 1.3L	診療科限定
24 輸液・栄養製剤	カリメート散 (5g/包)	通常採用
24 輸液・栄養製剤	キト [®] ミン輸液 300mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	キンタ [®] リー透析剤AF3号 6L (7L換算) (炭酸水素ナトリウム液付)	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ケルコンサンK細粒4mEq/g カリウム	通常採用
24 輸液・栄養製剤	サウ [®] イオゾ [®] ール輸液 500mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	サフ [®] ハ [®] ック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	スローケー錠600mg	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ソルデ [®] ム【1】輸液 500mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ソルデ [®] ム1輸液【 200mL】	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ソルデ [®] ム3A輸液【200mL】	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ソルデ [®] ム3A輸液 500mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ツインバ [®] ル輸液【500mL】	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ツインバ [®] ル輸液 1L	通常採用
24 輸液・栄養製剤	テルモ生食『500ml』	通常採用
24 輸液・栄養製剤	テルモ生食 100ml	通常採用
24 輸液・栄養製剤	テルモ生食【 250mL】	通常採用
24 輸液・栄養製剤	トリフリド [®] 輸液 1L	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ハイカリックRF輸液 500mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ハイカリック液-2号 700mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ヒ [®] -フリド [®] 輸液 1L	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ヒ [®] カーボン輸液 500mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ブ [®] ド [®] ウ糖注射液 20%20ml	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ブ [®] ド [®] ウ糖注射液 5%20ml	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ブ [®] ド [®] ウ糖注射液 50%20ml	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ヘスバ [®] ンダ [®] -輸液 500mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ヘバ [®] ンED配合内用剤 (80g/袋)	通常採用
24 輸液・栄養製剤	メイロン静注7% 250mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	メト [®] レニック注シリンジ [®] 2mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ラクテック【G】輸液 500mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ラクテック注 500mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ラコ [®] ルNF配合経腸用液 (コーヒー)200mL/袋	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ラコ [®] ルNF配合経腸用液 (バナナ)200mL/袋	通常採用
24 輸液・栄養製剤	ラコ [®] ルNF配合経腸用液 (ミルク)200mL/袋	通常採用
24 輸液・栄養製剤	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」 0.5㍻L20mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	重ソ [®] -静注7%「NS」 20mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	生食液NS 20mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	生食溶解液キットH 100mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	生理食塩液「ヒカリ」 (50ml/瓶)	通常採用
24 輸液・栄養製剤	生理食塩液「ヒカリ」 500mL (広口開栓型)	通常採用
24 輸液・栄養製剤	生理食塩液PL「フゾー」 1L	通常採用
24 輸液・栄養製剤	大塚食塩注10% 20mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	大塚糖液10% 500mL	通常採用
24 輸液・栄養製剤	大塚糖液5% [50mL]	通常採用
24 輸液・栄養製剤	大塚糖液5% 『100mL』	通常採用
24 輸液・栄養製剤	大塚糖液5% 【250mL】	通常採用
24 輸液・栄養製剤	大塚糖液5% 500m l	通常採用
24 輸液・栄養製剤	低分子デ [®] キストラン糖注 500mL	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
25	血液製剤	テタノブリンH静注1500単位 1,500国際単位	通常採用
25	血液製剤	ハプトグロビン静注2000単位「ヘネス」 2千単位100	通常採用
25	血液製剤	プラスマブロティンフラクション静注液4.4% 250mL	通常採用
25	血液製剤	ホルビール組織接着用 3mL4瓶	通常採用
25	血液製剤	ホルビール組織接着用 5mL4瓶	通常採用
25	血液製剤	乾燥HBグロブリン 1,000単位5mL (溶解液付)	通常採用
25	血液製剤	献血ノスロン1500注射用 1500単位	通常採用
25	血液製剤	献血ノスロン500注射用 500単位	通常採用
25	血液製剤	献血ヘニロン-I 静注用2500mg 2.5g50mL (溶解液付)	通常採用
25	血液製剤	赤十字アルブミン20%静注10g/50mL	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
26	造血薬	インクレミンシロップ 5%	通常採用
26	造血薬	エスホ [®] -皮シリンジ [®] (6000IU/筒)	通常採用
26	造血薬	エスホ [®] -皮下用シリンジ [®] (24000IU/筒)	通常採用
26	造血薬	ネスブ [®] 注射液10 μ g/1mLブ [®] ラシリンジ [®]	通常採用
26	造血薬	ネスブ [®] 注射液120 μ g/0.6mLブ [®] ラシリンジ [®]	通常採用
26	造血薬	ネスブ [®] 注射液15 μ g/1mLブ [®] ラシリンジ [®]	通常採用
26	造血薬	ネスブ [®] 注射液20 μ g/1mLブ [®] ラシリンジ [®]	通常採用
26	造血薬	ネスブ [®] 注射液30 μ g/1mLブ [®] ラシリンジ [®]	通常採用
26	造血薬	ネスブ [®] 注射液40 μ g/1mLブ [®] ラシリンジ [®]	通常採用
26	造血薬	ネスブ [®] 注射液60 μ g/0.6mLブ [®] ラシリンジ [®]	通常採用
26	造血薬	ノイアツブ [®] 注50 μ g (溶解液付)	通常採用
26	造血薬	フェジ [®] ン静注40mg 2mL	通常採用
26	造血薬	フェロ [®] ・ケ [®] ラテ [®] ュメット錠105mg	通常採用
26	造血薬	フェロチ [®] -ム錠50 鉄50mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
27	止血薬	アトナ錠 30mg	通常採用
27	止血薬	アトナ注(静脈用) 25mg 0.5%5mL	通常採用
27	止血薬	アルト原末 500mg	通常採用
27	止血薬	エキシクルール1%注射液 30mL	通常採用
27	止血薬	オルタミン注射用1g 10%10g	通常採用
27	止血薬	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット綿型5.1×2.5cm	通常採用
27	止血薬	スポンセル 5cm×2.5cm	通常採用
27	止血薬	トランサミン錠 250mg	通常採用
27	止血薬	トランサミン注5% 5mL	通常採用
27	止血薬	トロンビン液モチダ ソフトトル1万10,000単位10mL	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
28	抗血栓薬	アンブラグ錠 100mg	通常採用
28	抗血栓薬	アンブラグ錠 50mg	通常採用
28	抗血栓薬	ウロキナーゼ注「フジ」60000単位	通常採用
28	抗血栓薬	エパテールS300 300mg	通常採用
28	抗血栓薬	エパテールS900 900mg	通常採用
28	抗血栓薬	クリアクテ静注用160万 160万国単位	通常採用
28	抗血栓薬	スロンノHI注10mg/2mL	通常採用
28	抗血栓薬	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	通常採用
28	抗血栓薬	ハイアスピリン錠 100mg	通常採用
28	抗血栓薬	フラビックス錠 25mg	通常採用
28	抗血栓薬	フラビックス錠 75mg	通常採用
28	抗血栓薬	フレタルOD錠100mg	通常採用
28	抗血栓薬	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「味の素」1万単位	通常採用
28	抗血栓薬	ヘミロックヘパリンロック用10単位/mLシリンジ 5mL 50単位	通常採用
28	抗血栓薬	ヘパロストNa錠20μg「サワイ」	通常採用
28	抗血栓薬	ワルファリンカリウム錠 0.50mg「HD」	通常採用
28	抗血栓薬	ワルファリンカリウム錠 1.00mg「HD」	通常採用
28	抗血栓薬	ワルファリンカリウム錠 2.00mg「HD」	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
29 降圧薬	アチスト錠 1.25mg	通常採用
29 降圧薬	アチスト錠 10mg	通常採用
29 降圧薬	アチスト錠 2.5mg	通常採用
29 降圧薬	アチスト錠 20mg	通常採用
29 降圧薬	アチスト15mg錠	通常採用
29 降圧薬	アテック錠 10mg	通常採用
29 降圧薬	アテック錠 5mg	通常採用
29 降圧薬	アバフ ロ錠100mg	通常採用
29 降圧薬	アバフ ロ錠50mg	通常採用
29 降圧薬	アムロジビ ンOD錠10mg「EMEC」	通常採用
29 降圧薬	アムロジビ ンOD錠2.5mg「明治」	通常採用
29 降圧薬	アムロジビ ンOD錠5mg「明治」	通常採用
29 降圧薬	インテラル錠 10mg	通常採用
29 降圧薬	インテラル注射液2mg 0.1%2mL	通常採用
29 降圧薬	エックスフォーシ 配合錠	通常採用
29 降圧薬	オルメック錠10mg	通常採用
29 降圧薬	オルメック錠20mg	通常採用
29 降圧薬	オルメック錠40mg	通常採用
29 降圧薬	カデュエット配合錠3番	通常採用
29 降圧薬	カデュエット配合錠4番	通常採用
29 降圧薬	カルバトゲン錠0.5mg	通常採用
29 降圧薬	カルバトゲン錠1mg	通常採用
29 降圧薬	カルバトゲン錠2mg	通常採用
29 降圧薬	カルバトゲン錠4mg	通常採用
29 降圧薬	カルプロック錠16mg	通常採用
29 降圧薬	カルプロック錠8mg	通常採用
29 降圧薬	コディオ配合錠EX	通常採用
29 降圧薬	コバスロ錠2mg	通常採用
29 降圧薬	コバスロ錠4mg	通常採用
29 降圧薬	シプロロン錠20	通常採用
29 降圧薬	スピロラクトン錠25mg「タナハ」	通常採用
29 降圧薬	スピロラクトン錠50mg「タナハ」	通常採用
29 降圧薬	セララ錠100mg	通常採用
29 降圧薬	セララ錠50mg	通常採用
29 降圧薬	ディオバン錠 40mg	通常採用
29 降圧薬	ディオバン錠 80mg	通常採用
29 降圧薬	ディオバン錠160mg	通常採用
29 降圧薬	ディオバン錠20mg	通常採用
29 降圧薬	トワミン錠 25mg	通常採用
29 降圧薬	トワミン錠 50mg	通常採用
29 降圧薬	ニカルビン注射液10mg 10mL	通常採用
29 降圧薬	ニカルビン注射液25mg 25mL	通常採用
29 降圧薬	ニカルビン注射液2mg 2mL	通常採用
29 降圧薬	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	通常採用
29 降圧薬	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	通常採用
29 降圧薬	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	通常採用
29 降圧薬	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	通常採用
29 降圧薬	ニューロタン錠100mg	通常採用
29 降圧薬	ニューロタン錠50mg	通常採用
29 降圧薬	ノルバスク錠 2.5mg	通常採用
29 降圧薬	ノルバスク錠 5mg	通常採用
29 降圧薬	フルイトラン錠 2mg	通常採用
29 降圧薬	プレミント配合錠	通常採用
29 降圧薬	プロセミト 錠20「タイヨ」	通常採用
29 降圧薬	プロセミト 錠40「タイヨ」 40mg	通常採用
29 降圧薬	プロセミト 注20mg「タイヨ」	通常採用
29 降圧薬	プロプレス錠 12mg	通常採用
29 降圧薬	プロプレス錠 4mg	通常採用
29 降圧薬	プロプレス錠 8mg	通常採用
29 降圧薬	プロプレス錠2 2mg	通常採用
29 降圧薬	ヘルベツサ-Rカプセル100mg	通常採用
29 降圧薬	ミカルデイス錠 20mg	通常採用
29 降圧薬	ミカルデイス錠 40mg	通常採用
29 降圧薬	ミカルデイス錠80mg	通常採用
29 降圧薬	ラシレス錠150mg	通常採用
29 降圧薬	ラデール錠20 20mg	通常採用

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
29 降圧薬	ランデール錠40 40mg	通常採用
29 降圧薬	レニペーゼ錠 10mg	通常採用
29 降圧薬	レニペーゼ錠 2.5mg	通常採用
29 降圧薬	レニペーゼ錠 5mg	通常採用
29 降圧薬	ロサルタンカリウム錠25mg「NP」	通常採用
29 降圧薬	ワイテンス錠2mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
30	狭心症治療薬	アイトロール錠 20mg	通常採用
30	狭心症治療薬	コリアンコワ錠100 100mg	通常採用
30	狭心症治療薬	ニコランシ [®] ル点滴静注用12mg「サワイ」	通常採用
30	狭心症治療薬	ニコランシ [®] ル点滴静注用48mg「サワイ」	通常採用
30	狭心症治療薬	ニコランマート錠5mg	通常採用
30	狭心症治療薬	ニトロールRカ [®] セル20mg	通常採用
30	狭心症治療薬	ニトロール錠5mg	通常採用
30	狭心症治療薬	ニトロール注5mg 0.05%10mL	通常採用
30	狭心症治療薬	ニトログ [®] ーMTTS25mg 10cm2	通常採用
30	狭心症治療薬	ニトログ [®] ン舌下錠0.3mg	通常採用
30	狭心症治療薬	ビ [®] ロアン錠100 100mg	通常採用
30	狭心症治療薬	ビ [®] ロアン錠25 25mg	通常採用
30	狭心症治療薬	ミオコルスフ [®] レ-0.3mg 0.65%7.2g	通常採用
30	狭心症治療薬	ミオコル静注5mg 10mL	通常採用
30	狭心症治療薬	ミオコル点滴静注50mg 100mL	通常採用
30	狭心症治療薬	ロコルナル錠100mg	通常採用
30	狭心症治療薬	硝酸イソソルビ [®] ト [®] テープ 40mg「EMEC」	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
31 抗不整脈薬	アスヘノカフセル 20mg	通常採用
31 抗不整脈薬	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	通常採用
31 抗不整脈薬	アミサリン注100mg 10%1mL	通常採用
31 抗不整脈薬	オリヘス点滴用1% 200mL	通常採用
31 抗不整脈薬	サンリスム注射液50 50mg5mL	通常採用
31 抗不整脈薬	シヘノール錠 100mg	通常採用
31 抗不整脈薬	シヘノール錠 50mg	通常採用
31 抗不整脈薬	シヘノール静注70mg 5mL	通常採用
31 抗不整脈薬	ジルチアゼム塩酸塩注射用250mg「サワイ」	通常採用
31 抗不整脈薬	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	通常採用
31 抗不整脈薬	シンビット静注用50mg	通常採用
31 抗不整脈薬	ソタコル錠40mg	患者限定採用
31 抗不整脈薬	タンホーコル錠 100mg	通常採用
31 抗不整脈薬	ヒルシカイント塩酸塩カフセル25mg「サワイ」	通常採用
31 抗不整脈薬	ヒルシカイント塩酸塩カフセル50mg「サワイ」	通常採用
31 抗不整脈薬	ヘプーリコル錠100mg	通常採用
31 抗不整脈薬	ヘプーリコル錠50mg	通常採用
31 抗不整脈薬	ヘラハミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」 0.25%2mL	通常採用
31 抗不整脈薬	メクトライトカフセル100 100mg	通常採用
31 抗不整脈薬	メクトライトカフセル50 50mg	通常採用
31 抗不整脈薬	リスモダンP静注50mg 5mL	通常採用
31 抗不整脈薬	リスモダンR錠 150mg	通常採用
31 抗不整脈薬	リスモダンカフセル100mg	通常採用
31 抗不整脈薬	リトカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	通常採用
31 抗不整脈薬	ワソラン錠40mg	通常採用
31 抗不整脈薬	注射用オノアクト50 50mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
32	心不全治療薬・昇圧薬	アトレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	イノバリン注0.3%シリンジ 50mL	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	エチール注10mg 1%1mL	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	ジゴキシンKY錠 0.25mg	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	ジゴキシン散0.1% (mg/g)	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	ジゴキシン注0.25mg 0.025%1mL	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	タトールハート顆粒75% (1g/包)	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	ドブホン注0.3%シリンジ 50mL	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	ネオネジニョーク注1mg 0.1%1mL	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	ノイノ錠 10mg	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	ノルアドレナリン注1mg 0.1%1mL	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	ハーフジゴキシンKY錠 0.125mg	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	ハンプ注射用1000μg	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	ヒモエンタシン錠1.25mg「TE」	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	プロタノール注0.2mg 0.02%1mL	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	ホスミン注1mg 0.1%1mL	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	ミリノ注22.5mgパック「タカ」150mL	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	メトリン錠 2mg	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	リスミック錠 10mg	通常採用
32	心不全治療薬・昇圧薬	塩酸ドパミン注キット600(200)	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
33	血管拡張薬	アルブ ロスタジール注10 μ gシリンジ「サワイ」 2mL	通常採用
33	血管拡張薬	アルブ ロスタジール注5 μ gシリンジ「サワイ」 1mL	通常採用
33	血管拡張薬	カルナクリン錠 50	通常採用
33	血管拡張薬	タンデ トロン注射用20 20 μ g	通常採用
33	血管拡張薬	タンデ トロン注射用500 500 μ g	通常採用
33	血管拡張薬	トラクリア錠 62.5mg	院内患者限定
33	血管拡張薬	リマルモン錠5 μ g	通常採用
33	血管拡張薬	静注用フローラン0.5mg	患者限定採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
34	利尿薬	20%マンニトール注射液「YD」 300mL	通常採用
34	利尿薬	イソハ [®] イト [®] シロップ 70%	通常採用
34	利尿薬	ケ [®] リマッケン注 200mL	通常採用
34	利尿薬	タ [®] イアト錠 30mg	通常採用
34	利尿薬	タ [®] イアト錠60mg	通常採用
34	利尿薬	タ [®] イアモックス錠250mg	通常採用
34	利尿薬	ヘ [®] ネクトミン静注用200mg	通常採用
34	利尿薬	ラシックス注100mg	通常採用
34	利尿薬	ルフ [®] ラック錠 4mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
35	気管支拡張薬	エフトリン「カ」 注射液	通常採用
35	気管支拡張薬	オンブレス吸入用カプセル150 μ g (7cap/シート)	通常採用
35	気管支拡張薬	サルタノールインヘラー100 μ g 0.16%13.5mL	通常採用
35	気管支拡張薬	スピリーバ [®] 2.5 μ gレスピマット60吸入 150 μ g	通常採用
35	気管支拡張薬	スピリーバ [®] 吸入用カプセル18 μ g (7cap/シート)	通常採用
35	気管支拡張薬	セレベント50 [®] イスカス 50 μ g60 [®] リスター	通常採用
35	気管支拡張薬	チャンピックス錠0.5mg	通常採用
35	気管支拡張薬	チャンピックス錠1mg	通常採用
35	気管支拡張薬	ツロブテロールテープ [®] 1mg「HMT」	通常採用
35	気管支拡張薬	ツロブテロールテープ [®] 2mg「HMT」	通常採用
35	気管支拡張薬	テオトール顆粒20% (200mg/g)	通常採用
35	気管支拡張薬	テルシカ [®] ンエゾ [®] ル100 μ g 0.178% 9.5g	通常採用
35	気管支拡張薬	ベネトリン吸入液0.5%	通常採用
35	気管支拡張薬	ミクロフィリン注射液2.5%	通常採用
35	気管支拡張薬	メフチソニ錠25 μ g 0.025mg	通常採用
35	気管支拡張薬	ユニフィルA錠100mg	通常採用
35	気管支拡張薬	ユニフィルA錠200mg	通常採用
35	気管支拡張薬	吸入液A液 (約束製剤)	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
36	気管支喘息治療薬	アス [®] マネックスツイストヘラ-100 μ g60吸入 6mg100 μ g	通常採用
36	気管支喘息治療薬	アス [®] マネックスツイストヘラ-200 μ g60吸入 12mg	通常採用
36	気管支喘息治療薬	アト [®] エ7100デ [®] イスカス60吸入用 607 [®] リスター	通常採用
36	気管支喘息治療薬	アト [®] エ7125エアゾ [®] -ル120吸入用 12.0g	通常採用
36	気管支喘息治療薬	アト [®] エ7250エアゾ [®] -ル120吸入用 12.0g	通常採用
36	気管支喘息治療薬	アト [®] エ7250デ [®] イスカス60吸入用 607 [®] リスター	通常採用
36	気管支喘息治療薬	アト [®] エ7500デ [®] イスカス60吸入用 607 [®] リスター	通常採用
36	気管支喘息治療薬	キユハ [®] -ル50エアゾ [®] -ル 7mg 8.7g	通常採用
36	気管支喘息治療薬	シムビ [®] コートタービ [®] ュヘイラ-60吸入	通常採用
36	気管支喘息治療薬	ハ [®] ルミコート200 μ gタービ [®] ュヘイラ-56吸入11.2mg	通常採用
36	気管支喘息治療薬	フルタイト [®] 100デ [®] イスカス 100 μ g607 [®] リスター	通常採用
36	気管支喘息治療薬	フルタイト [®] 200デ [®] イスカス 200 μ g607 [®] リスター	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名		正式名称	採用形態
37	呼吸促進薬	ロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 1mL	通常採用
37	呼吸促進薬	フルメチル静注液0.5mg「タイヨー」 5mL	通常採用
37	呼吸促進薬	注射用エラスターール100mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
38	鎮咳薬	アストミン錠10mg	通常採用
38	鎮咳薬	フスコデ [®] 配合シロップ [®]	通常採用
38	鎮咳薬	リン酸コデ [®] イン100倍散「ホエイ」 (10mg/g)	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
39	去痰薬	アンブ^ロキソール塩酸塩Lカブ^セル45mg「サワイ」	通常採用
39	去痰薬	アンブ^ロキソール塩酸塩シロップ^小児用0.3%「タイヨ-」	通常採用
39	去痰薬	クリアール錠 200mg	通常採用
39	去痰薬	ビ^ソルホ^ン錠4mg	通常採用
39	去痰薬	ブ^ロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ-」	通常採用
39	去痰薬	ブ^ロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨ-」0.2%2mL	通常採用
39	去痰薬	ムコダ^イン錠 250mg	通常採用
39	去痰薬	ムコダ^イン錠500mg	通常採用
39	去痰薬	ムコフィリン吸入液20% 17.62%2mL	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
40	健胃消化薬・胃腸機能調整薬	イトブ [®] リト [®] 塩酸塩錠50mg「タハ [®] 」	通常採用
40	健胃消化薬・胃腸機能調整薬	カ [®] スモチン錠 5mg	通常採用
40	健胃消化薬・胃腸機能調整薬	セレキノ錠100mg	通常採用
40	健胃消化薬・胃腸機能調整薬	タフマックE配合カブ [®] セル	通常採用
40	健胃消化薬・胃腸機能調整薬	タフマックE配合顆粒	通常採用
40	健胃消化薬・胃腸機能調整薬	ト [®] ンハ [®] リト [®] ン錠10mg「EMEC」	通常採用
40	健胃消化薬・胃腸機能調整薬	ナウゼ [®] リン坐剤30 30mg	通常採用
40	健胃消化薬・胃腸機能調整薬	ナウゼ [®] リン坐剤60 60mg	通常採用
40	健胃消化薬・胃腸機能調整薬	ネオプ [®] ラミール注射液10mg 0.5%2mL	通常採用
40	健胃消化薬・胃腸機能調整薬	ハ [®] ソクレアチン	通常採用
40	健胃消化薬・胃腸機能調整薬	リハ [®] クレオンカブ [®] セル150mg	通常採用
40	健胃消化薬・胃腸機能調整薬	リハ [®] クレオン顆粒300mg分包	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
41	消化性潰瘍治療薬	アルロイト®G内用液5%	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	エスメラルダ®錠 400mg	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	カマク®G「ヒシヤ」〔「重質」〕	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	カマク®G「ヒシヤ」〔「重質」〕 (1g/包)	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	サイトテック錠 100μg	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	スクラルファート細粒90%「タイヨ」 (1g/包)	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	スクラルファート内用液10%「タイヨ」 (10ml/包)	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	セルテブ®ン細粒10% (0.5g/包)	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	ソロン細粒20% (0.5g/包)	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	タケブ®ロンOD錠15mg	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	タケブ®ロン静注用30mg	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	チアトニカブ®セル 10mg	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	トーフス®レン配合顆粒 (0.67g/包)	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	ノイェル細粒40% (0.5g/包)	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	ハ®リエット錠 10mg	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	ハ®リエット錠 20mg	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	ファモチジン®D錠10mg「サワイ」	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	ファモチジン®D錠20mg「サワイ」	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	ブ®スコバン®錠10mg	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	ブ®スコバン®注射液20mg 2%1mL	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	ブ®ロマックD錠75 75mg	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	マク®テクト配合内服液分包 (10ml/本)	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	マク®ミット錠250mg	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	マク®ミット錠330mg	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	マク®ミット錠500mg	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	ムコスタ錠100mg	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	ユービ®ット錠 100mg	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	ラニチジン®注射液50mg「タイヨ」 2.5%2mL	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	ランザップ® 800	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	ランソップ®ラゾールOD錠15mg「タイヨ」	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	ランソップ®ラゾールOD錠30mg「タイヨ」	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	炭酸水素ナトリウム	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	沈降炭酸カルシウム (0.5g/包)	通常採用
41	消化性潰瘍治療薬	沈降炭酸カルシウム (1g/包)	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
42 腸疾患治療薬	アサコール錠400mg	通常採用
42 腸疾患治療薬	イリボ [®] -錠5 μ g	通常採用
42 腸疾患治療薬	エンテロ [®] ン-R散 (1g/包)	通常採用
42 腸疾患治療薬	ガ [®] スコント [®] ロップ [®] 内用液2%	通常採用
42 腸疾患治療薬	ガ [®] スコ錠 40mg	通常採用
42 腸疾患治療薬	サラゾ [®] スルファヒ [®] リジ [®] ン錠500mg「タイコ」	通常採用
42 腸疾患治療薬	サラゾ [®] ヒ [®] リン坐剤500mg	通常採用
42 腸疾患治療薬	ステロネマ注腸1.5mg 1.975mg	通常採用
42 腸疾患治療薬	タンナルヒ [®] ン「ホエイ」	通常採用
42 腸疾患治療薬	トランコロン錠7.5mg	通常採用
42 腸疾患治療薬	ビ [®] オフェルミン配合散 (1g/包)	通常採用
42 腸疾患治療薬	フレト [®] ネマ注腸20mg	患者限定採用
42 腸疾患治療薬	ヘ [®] ンタサ錠250mg	通常採用
42 腸疾患治療薬	ヘ [®] ンタサ錠500mg	通常採用
42 腸疾患治療薬	ヘ [®] ンタサ注腸1g	通常採用
42 腸疾患治療薬	ホ [®] リアル細粒83.3% (1.2g/包)	通常採用
42 腸疾患治療薬	ホ [®] リアル錠500mg	通常採用
42 腸疾患治療薬	ミヤBM錠 20mg	通常採用
42 腸疾患治療薬	ラックヒ [®] -微粒N 1%	通常採用
42 腸疾患治療薬	ロベ [®] ラミト [®] 塩酸塩カ [®] セル1mg「タイコ」	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
43	下剤	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	通常採用
43	下剤	アロゼン顆粒（0.5g/包）	通常採用
43	下剤	インカルボン坐剤	通常採用
43	下剤	ケリセリン浣腸「オタ」120 50%120mL	通常採用
43	下剤	ケリセリン浣腸「オタ」60 50%60mL	通常採用
43	下剤	ケリセリン浣腸「オタ」小児用30 50%30mL	通常採用
43	下剤	スルチミン錠2.5mg	通常採用
43	下剤	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%（10mL/本）	通常採用
43	下剤	ピジクリア配合錠（前処置）	通常採用
43	下剤	フルセニト錠12mg	通常採用
43	下剤	マケコロール 250mL	通常採用
43	下剤	マケコロールP「在宅ハチ」（100g/袋）	通常採用
43	下剤	ムヘン配合内用剤	通常採用
43	下剤	ラキソベロン錠2.5mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
44 胆道疾患治療薬	ウル錠 100mg	通常採用
44 胆道疾患治療薬	ユスハ [®] /ソ錠 40mg	通常採用
44 胆道疾患治療薬	塩酸ハ [®] ハ [®] リン注射液 40mg1ml	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
45 肝疾患治療薬	イントロンA注射用300 (300万IU/瓶)	院内患者限定
45 肝疾患治療薬	コペカス錠200mg	通常採用
45 肝疾患治療薬	セフィックス錠 100mg	通常採用
45 肝疾患治療薬	タウリン散98%「大正」(1.02g/包)	通常採用
45 肝疾患治療薬	ハラケルト錠0.5mg	院外患者限定
45 肝疾患治療薬	プロペパール配合錠	通常採用
45 肝疾患治療薬	ヘパシス皮下注180 μ g 1mL	患者限定採用
45 肝疾患治療薬	ヘパシス皮下注90 μ g 1mL	患者限定採用
45 肝疾患治療薬	ヘパシス皮下注100 μ g/0.5mL用	患者限定採用
45 肝疾患治療薬	ヘパシス皮下注150 μ g/0.5mL用(溶解液付)	通常採用
45 肝疾患治療薬	ヘパシス皮下注50 μ g/0.5mL用	患者限定採用
45 肝疾患治療薬	モニラック・シロップ 65%	通常採用
45 肝疾患治療薬	ラケノセリ-分包16.05g 40.496%	通常採用
45 肝疾患治療薬	リーパクト配合顆粒 4.15g	通常採用
45 肝疾患治療薬	レボトルカフセル 200mg	患者限定採用
45 肝疾患治療薬	強力材ミノファゲンP静注20mL	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
46	瘧疾患治療薬	カ ⁺ ヘ ⁺ キサートミル酸塩注射用100mg「サワイ」	通常採用
46	瘧疾患治療薬	カ ⁺ ヘ ⁺ キサートミル酸塩注射用500mg「サワイ」	通常採用
46	瘧疾患治療薬	カモストン錠 100mg	通常採用
46	瘧疾患治療薬	ミラクリット [®] 注射液10万単位 100,000単位2mL	通常採用
46	瘧疾患治療薬	ミラクリット [®] 注射液5万単位 50,000単位1mL	通常採用
46	瘧疾患治療薬	注射用ブ ⁺ セロン10mg	通常採用
46	瘧疾患治療薬	注射用ブ ⁺ セロン50mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	25mgコントミン注	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	アナフニール錠25mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	アナフニール点滴静注液25mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	アピリット錠50mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	アモキサンカプセル10mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	アンデフル錠 25mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	イングエガ錠3mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	エビリファイ錠12mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	ケラマリール錠 25mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	コントミン糖衣錠12.5mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	コントミン糖衣錠50mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	サインバルタカプセル20mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	サインバルタカプセル30mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	ジプロレキサ錠10mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	ジプロレキサ錠2.5mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	セレネース細粒1% (10mg/g)	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	セロクエル100mg錠	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	セロクエル25mg錠	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	セロクエル細粒50% (500mg/g)	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	テトラミト錠10mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	トフラニール錠 10mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	トリプタノール錠 10mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	トリプタノール錠 25mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	トレドミン錠25mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	ノバミン筋注5mg 0.5%1mL	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	ノバミン錠 5mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	ハギシル錠 20mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	ハギシル錠10mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	ヒルナミン錠 (50mg)	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	ベケタミン-A配合錠	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	ベケタミン-B配合錠	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	メイラックス錠2mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	リーマス錠200 200mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	リスパリドン内用液1mg分包「マイラン」 0.1%1mL	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	リントン注5mg 0.5%1mL	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	ルジオミール錠25mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	ルボックス錠 25mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	ルボックス錠 50mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	レボトミン錠25mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	レボトミン錠5mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	レモロン錠15mg	通常採用
47 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬	ロセソ錠4mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
48	抗不安薬、睡眠薬	2mgセルシン錠	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	アタラックス-P注射液（25mg/ml）	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	アモバン錠10 10mg ★患者希望の為	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	エチゾラム錠0. 5mg「EMEC」	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	コンスタン0. 4mg錠	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	コンスタン0. 8mg錠	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	ジ・アゼ・ハム錠2「トワ」 2mg	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	ジ・アゼ・ハム錠5「トワ」 5mg	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	セルシン注射液5mg	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	ゾピクール錠10 10mg	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	チスボン錠10	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	チスボン錠5	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	デハス錠0. 5mg ★患者希望の為	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	フェノバル散10%（100mg/g）	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	フェノバル錠30mg	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	フェノバル注射液100mg 10%1mL	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	フルニトラゼハム錠2mg「アメル」	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	プロチゾラムOD錠0. 25mg「タイヨー」	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	マイスリー錠 5mg	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	マイスリー錠10mg	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	ユーハノン錠1. 0mg 1mg	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	リーゼ錠 10mg	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	リーゼ錠5mg	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	リスミ錠2mg	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	レキソタン錠5 5mg	通常採用
48	抗不安薬、睡眠薬	ロヒプノール静注用2mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
49	抗てんかん薬	アレビ [®] アチン錠 100mg	通常採用
49	抗てんかん薬	アレビ [®] アチン注250mg 5%5mL	通常採用
49	抗てんかん薬	エクセミト [®] 錠100mg	通常採用
49	抗てんかん薬	ガ [®] ハ [®] ヘ [®] ン錠200mg	通常採用
49	抗てんかん薬	セレブ [®] シロップ 5% (4ml/本)	通常採用
49	抗てんかん薬	タ [®] イアップ [®] 坐剤10 10mg	通常採用
49	抗てんかん薬	テグ [®] レトール錠 100mg	通常採用
49	抗てんかん薬	テグ [®] レトール錠 200mg	通常採用
49	抗てんかん薬	テ [®] ハ [®] ケンシロップ 5%	通常採用
49	抗てんかん薬	テ [®] ハ [®] ケン細粒40% (0. 5g/包)	通常採用
49	抗てんかん薬	ハ [®] ルブ [®] ロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」	通常採用
49	抗てんかん薬	ラント [®] セン錠0. 5mg	通常採用
49	抗てんかん薬	ラント [®] セン錠1mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
50 片頭痛治療薬	イミグ [®] ラン錠50 50mg	通常採用
50 片頭痛治療薬	シ [®] ヒテ [®] ルコ [®] ット錠1mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
51	制吐薬、鎮暈薬	アロキソ静注0.75mg 5mL	通常採用
51	制吐薬、鎮暈薬	イメント [®] カブ [®] セル125mg	通常採用
51	制吐薬、鎮暈薬	イメント [®] カブ [®] セル80mg	通常採用
51	制吐薬、鎮暈薬	イメント [®] カブ [®] セルセット	通常採用
51	制吐薬、鎮暈薬	グ [®] ラニセトロン点滴静注液3mgパ [®] ック [®] 「BX」 100mL	通常採用
51	制吐薬、鎮暈薬	トラベ [®] ルミン配合錠	通常採用
51	制吐薬、鎮暈薬	ナゼ [®] アOD錠0.1mg	通常採用
51	制吐薬、鎮暈薬	メリスロン錠 6mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
52	H ⁺ -キソン病治療薬	アキテ [®] ン錠1mg	患者限定採用
52	H ⁺ -キソン病治療薬	カバ [®] サル錠0.25mg	通常採用
52	H ⁺ -キソン病治療薬	カバ [®] サル錠1.0mg 1mg	院外・科限定
52	H ⁺ -キソン病治療薬	コムタン錠100mg	通常採用
52	H ⁺ -キソン病治療薬	シンメトレル錠 100mg	通常採用
52	H ⁺ -キソン病治療薬	シンメトレル錠50mg	通常採用
52	H ⁺ -キソン病治療薬	タスモリン注5mg 0.5%1mL	通常採用
52	H ⁺ -キソン病治療薬	テ [®] ハ [®] ロ錠2.5mg	通常採用
52	H ⁺ -キソン病治療薬	ト [®] ハ [®] ストン静注25mg 0.25%10mL	通常採用
52	H ⁺ -キソン病治療薬	ト [®] フ [®] スカフ [®] セル100mg	通常採用
52	H ⁺ -キソン病治療薬	ト [®] フ [®] スカフ [®] セル200mg	通常採用
52	H ⁺ -キソン病治療薬	トリフェシ [®] ノン錠2mg	通常採用
52	H ⁺ -キソン病治療薬	ヒ [®] ・シフロ [®] ル錠0.5mg	通常採用
52	H ⁺ -キソン病治療薬	ヘ [®] ルマックス錠250μg	通常採用
52	H ⁺ -キソン病治療薬	メネット配合錠100	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
53	脳循環・代謝改善薬、抗痴呆薬	アデホス-ルコ-ワ注20mg	通常採用
53	脳循環・代謝改善薬、抗痴呆薬	アデホス-ワ顆粒10%(100mg/g)	通常採用
53	脳循環・代謝改善薬、抗痴呆薬	エタラホ-ン点滴静注30mgパ-ック「アイロム」 100mL	通常採用
53	脳循環・代謝改善薬、抗痴呆薬	オザク-ルNa点滴静注40mg「MEEK」 4mL	通常採用
53	脳循環・代謝改善薬、抗痴呆薬	オザク-ルNa点滴静注80mg「MEEK」 8mL	通常採用
53	脳循環・代謝改善薬、抗痴呆薬	サルモン錠5mg	通常採用
53	脳循環・代謝改善薬、抗痴呆薬	テクニス錠20 20mg	通常採用
53	脳循環・代謝改善薬、抗痴呆薬	トネ-ジ-ル塩酸塩0D錠5mg「サワイ」	通常採用
53	脳循環・代謝改善薬、抗痴呆薬	ヒ-ナトスカフ-セル10mg	通常採用
53	脳循環・代謝改善薬、抗痴呆薬	メマリ-錠10mg	通常採用
53	脳循環・代謝改善薬、抗痴呆薬	メマリ-錠20mg	通常採用
53	脳循環・代謝改善薬、抗痴呆薬	リハ-スタッチパ-ッチ13. 5mg	通常採用
53	脳循環・代謝改善薬、抗痴呆薬	レミニ-ル0D錠8mg（持参薬臨時採用薬）	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
54	自律神経作用薬	アトロピ ^ン 注0.05%シリンジ「テルモ」1mL	通常採用
54	自律神経作用薬	ウブ ^レ チド ^錠 5mg	通常採用
54	自律神経作用薬	グ ^ラ ンタ ^キ ン錠50 50mg	通常採用
54	自律神経作用薬	ブ ^リ テ ^ィ オン静注200mg 2mL	通常採用
54	自律神経作用薬	ヘ ^サ コリン散5% (50mg/g)	通常採用
54	自律神経作用薬	マイテラ ^ゼ 錠10mg	通常採用
54	自律神経作用薬	ワコ ^ス チグ ^ミ ン注0.5mg	通常採用
54	自律神経作用薬	硫酸アトロピ ^ン 注射液1ml	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
55	筋弛緩薬	エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	通常採用
55	筋弛緩薬	タ ⁺ ントリウムカブ ⁺ セル25mg	患者限定採用
55	筋弛緩薬	タ ⁺ ントリウム静注用20mg	通常採用
55	筋弛緩薬	テルネリン錠 1mg	通常採用
55	筋弛緩薬	マスキュラックス静注用10mg	通常採用
55	筋弛緩薬	マスキュラックス静注用4mg（溶解液付）	通常採用
55	筋弛緩薬	ミオリラク錠50mg	通常採用
55	筋弛緩薬	レキシソ注用200mg（溶解液付）	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
56	麻薬および類似薬	MSコンチン錠 10mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	MSコンチン錠 30mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	MSコンチン錠 60mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	アルチバ® 静注用2mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	オキシコンチン錠 10mg	院内採用
56	麻薬および類似薬	オキシコンチン錠 5mg	院内採用
56	麻薬および類似薬	オキシコンチン錠20mg	院内採用
56	麻薬および類似薬	オキシコンチン錠40mg	院内採用
56	麻薬および類似薬	オキノーム散10mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	オキノーム散2.5mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	オキノーム散5mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	オキファスト注10mg 1%1mL	通常採用
56	麻薬および類似薬	オキファスト注50mg 1%5mL	通常採用
56	麻薬および類似薬	オパ® ソ内服液 10mg/5mL	通常採用
56	麻薬および類似薬	オパ® ソ内服液 5mg/2.5mL	通常採用
56	麻薬および類似薬	カテ® イアンカフ® セル 20mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	カテ® イアンカフ® セル 60mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	ソセコ® ン注射液15mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	テ® ュロテップ® MTハ® ッチ12.6mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	テ® ュロテップ® MTハ® ッチ16.8mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	テ® ュロテップ® MTハ® ッチ2.1mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	テ® ュロテップ® MTハ® ッチ4.2mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	テ® ュロテップ® MTハ® ッチ8.4mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	トラマルカフ® セル25mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	トラマルカフ® セル50mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	トラムセット配合錠	通常採用
56	麻薬および類似薬	ノルスハ® ンテ-ブ® 5mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	ハ® シ-フカフ® セル30mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	フェンタニル注射液0.1mg 0.005%2mL	通常採用
56	麻薬および類似薬	ブレ® ン注100mgシリンジ® 1%10mL	通常採用
56	麻薬および類似薬	ブレ® ン注50mgシリンジ® 1%5mL	通常採用
56	麻薬および類似薬	モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末	通常採用
56	麻薬および類似薬	レベ® タン坐剤0.2mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	レベ® タン注0.2mg	通常採用
56	麻薬および類似薬	塩酸モルヒネ錠 10mg	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
57	麻酔薬	1%デ「イブ」リバ「ン」注-キット 200mg20mL	通常採用
57	麻酔薬	1%デ「イブ」リバ「ン」注-キット 500mg50mL	通常採用
57	麻酔薬	1%ブ「ロホ」フォル注 1g100mL	通常採用
57	麻酔薬	1%ブ「ロホ」フォル注 200mg20mL	通常採用
57	麻酔薬	1%ブ「ロホ」フォル注 500mg50mL	通常採用
57	麻酔薬	ア「ナベ」イン注2mg/mL 0.2%100mL	通常採用
57	麻酔薬	ア「ナベ」イン注7.5mg/mL 0.75%20mL	通常採用
57	麻酔薬	ア「ネト」カインセ「リ」2% (50ml/本)	通常採用
57	麻酔薬	ア「ネト」カインセ「ス」2%	通常採用
57	麻酔薬	ア「ンベ」ツク坐剤 10mg	通常採用
57	麻酔薬	ア「ンベ」ツク坐剤 20mg	通常採用
57	麻酔薬	イ「ソゾ」ール注射用0.5g 500mg(溶解液付)	通常採用
57	麻酔薬	キ「シロ」カインボ「ン」フ「ス」レ8% (80g/本)	通常採用
57	麻酔薬	キ「シロ」カイン液「4%」 (100ml/本)	通常採用
57	麻酔薬	キ「シロ」カイン注射液「1%」エ「レ」ナミン (20ml/V)	通常採用
57	麻酔薬	ケ「タ」ール静注用200mg 20mL	通常採用
57	麻酔薬	ス「トロ」カイン錠5mg	通常採用
57	麻酔薬	セ「ホ」フレ「ン」吸入麻酔液 (250mL/瓶)	通常採用
57	麻酔薬	ド「ロ」レ「フ」タン注射液25mg (25mg/10ml/V)	通常採用
57	麻酔薬	ネ「ロ」ビ「ク」カイン注シリンジ 5mL	通常採用
57	麻酔薬	ハ「イス」コ皮下注0.5mg 0.05%1mL	通常採用
57	麻酔薬	ブ「レ」セ「テ」ックス静注液200μg「マル」イシ 2mL	通常採用
57	麻酔薬	マ「ー」カイン注0.25% (20ml/V)	通常採用
57	麻酔薬	マ「ー」カイン注0.5% (20ml/V)	通常採用
57	麻酔薬	マ「ー」カイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	通常採用
57	麻酔薬	マ「ー」カイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	通常採用
57	麻酔薬	ミ「タ」ゾ「ラム」注10mg「サント」 2mL	通常採用
57	麻酔薬	リ「ト」カインテ「ー」フ 18mg「ニ」フ「ロ」 30.5mm×50.0mm	通常採用
57	麻酔薬	リ「ト」カイン注「NM」0.5% (20ml/V)	通常採用
57	麻酔薬	リ「ト」カイン注「NM」1% (20ml/V)	通常採用
57	麻酔薬	リ「ト」カイン注「NM」2% (20ml/V)	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
58 眼科用剤	アスラヒン点眼液0.02% 5mL	通常採用
58 眼科用剤	オフロキシ眼軟膏0.3% (3.5g/本)	通常採用
58 眼科用剤	カリユ点眼液0.005% (5mL/瓶)	通常採用
58 眼科用剤	キサタン点眼液0.005% (2.5mL/本)	通常採用
58 眼科用剤	クラビット点眼液0.5% (5mL/本)	通常採用
58 眼科用剤	ケタス点眼液0.01% 0.5mg5mL	通常採用
58 眼科用剤	コソプト配合点眼液 (5mL/瓶)	通常採用
58 眼科用剤	コハラム点眼液0.02% 5mL	通常採用
58 眼科用剤	サンビロ点眼液2% 5mL	通常採用
58 眼科用剤	ジアクノリン注射用25mg (溶解液付)	通常採用
58 眼科用剤	タリロン点眼液0.3% (5mL/本)	通常採用
58 眼科用剤	ハタノール点眼液0.1% (5mL/本)	通常採用
58 眼科用剤	ヒアル点眼液0.1 0.1%5mL	通常採用
58 眼科用剤	ヒトス点眼液0.02% (5mL/本)	通常採用
58 眼科用剤	ヒトス点眼液0.1% (5mL/本)	通常採用
58 眼科用剤	ブラフロフェン点眼液0.1%「わかもと」(5mL/本)	通常採用
58 眼科用剤	ヘルベゾロン点眼・点鼻液(5mL/本)	通常採用
58 眼科用剤	ミケランA点眼液2%(2.5mL/瓶) (持参薬臨時採)	通常採用
58 眼科用剤	リスモン点眼液0.5% (5mL/本)	通常採用
58 眼科用剤	レスキュ点眼液0.12% (5mL/瓶)	通常採用
58 眼科用剤	人工涙液マイティア点眼液 5mL	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名		正式名称	採用形態
59	耳鼻咽喉科用剤	ハ [°] クトロハ [°] ン鼻腔用軟膏2% (3g/本)	通常採用
59	耳鼻咽喉科用剤	プ [°] リヒ [°] ナ液0.05%	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
60	皮膚科用剤	B・B・E6%軟膏(院内約束製剤)	通常採用
60	皮膚科用剤	FOY軟膏 (院内約束製剤)	通常採用
60	皮膚科用剤	アクトン軟膏3% (30g/本)	通常採用
60	皮膚科用剤	イソジニシカ- (院内約束製剤)	通常採用
60	皮膚科用剤	イワサック軟膏3% (10g/本)	通常採用
60	皮膚科用剤	エキザルベ (100g/瓶)	診療科限定
60	皮膚科用剤	エキザルベ (5g/本)	診療科限定
60	皮膚科用剤	オイラックスHクリーム (5g/本)	通常採用
60	皮膚科用剤	オイラックスクリーム10% (10g/本)	通常採用
60	皮膚科用剤	キンダベート軟膏0.05% (5g/本)	通常採用
60	皮膚科用剤	クリンダマイシンゲル1%「クラシエ」 (10g/本)	通常採用
60	皮膚科用剤	ゲーベンスクリーム1% (100g/瓶)	通常採用
60	皮膚科用剤	ゲーベンスクリーム1% (500g/瓶)	通常採用
60	皮膚科用剤	ゲーベンスクリーム1% (50g/本)	通常採用
60	皮膚科用剤	ケラチミンコワクリーム20% (25g/本)	通常採用
60	皮膚科用剤	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨ」1mg (10g/本)	通常採用
60	皮膚科用剤	スチール膏M 25cm2	通常採用
60	皮膚科用剤	セファトリム2% (10g/本)	通常採用
60	皮膚科用剤	ティフェリンゲル0.1% (15g/本)	通常採用
60	皮膚科用剤	テルモベートクリーム0.05% (5g/本)	通常採用
60	皮膚科用剤	テルモベートスカルプローション0.05% (10g/本)	通常採用
60	皮膚科用剤	テルモベート軟膏0.05% (5g/本)	通常採用
60	皮膚科用剤	ハスレン軟膏0.033%	通常採用
60	皮膚科用剤	ヒルドイドソフト軟膏0.3% (25g/本)	通常採用
60	皮膚科用剤	フィブラストスプレー500 500μg (溶解液付)	通常採用
60	皮膚科用剤	フェノール・亜鉛華リニメント	通常採用
60	皮膚科用剤	プロスタントイン軟膏0.003% (10g/本)	通常採用
60	皮膚科用剤	モースヘースト (院内約束製剤)	通常採用
60	皮膚科用剤	リフラップ軟膏5% (100g/瓶)	通常採用
60	皮膚科用剤	リフラップ軟膏5% (30g/本)	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
61	泌尿器・生殖器用剤	アホ ^ル フ ^カ セル0.5mg	通常採用
61	泌尿器・生殖器用剤	ウラリット配合錠	通常採用
61	泌尿器・生殖器用剤	エビ ^フ ロスタット配合錠SG	通常採用
61	泌尿器・生殖器用剤	エフ ^{ラン} チルカフ ^{セル} 15mg	通常採用
61	泌尿器・生殖器用剤	ステ ^フ ラ錠0.1mg	通常採用
61	泌尿器・生殖器用剤	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	通常採用
61	泌尿器・生殖器用剤	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	通常採用
61	泌尿器・生殖器用剤	ヘ ^シ ア錠5mg	通常採用
61	泌尿器・生殖器用剤	ホ ^ラ キス錠 2mg	通常採用
61	泌尿器・生殖器用剤	ユリ ^フ 錠4mg	通常採用
61	泌尿器・生殖器用剤	塩酸フ ^ロ ビ ^ヘ リン錠10mg「SW」	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名		正式名称	採用形態
62	子宮用剤	静注用マクネール 20mL	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名		正式名称	採用形態
63	痔疾患治療薬	サ-カネツ-ン配合錠	通常採用
63	痔疾患治療薬	強力ホ`ステリサ`ン(軟膏) (2g/本)	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
64	歯科・口腔用剤	SPトロチド0.25mg「明治」	通常採用
64	歯科・口腔用剤	アスリン含嗽水（院内約束製剤）	院内採用
64	歯科・口腔用剤	アロワリノールG含嗽液（口内炎）（院内約束製剤）	院内採用
64	歯科・口腔用剤	サリケリンカプセル30mg	通常採用
64	歯科・口腔用剤	サリハートエアゾール 50g	通常採用
64	歯科・口腔用剤	デキサルチン口腔用軟膏1mg/g 0.1%（2g/本）	通常採用
64	歯科・口腔用剤	オキシジンガーゲル7%（30ml/本）	通常採用
64	歯科・口腔用剤	含嗽用ハチアスリ顆粒 0.1%（2g/包）	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
65 解毒薬	クレマシ [®] ンカフ [®] セル200mg	通常採用
65 解毒薬	クレマシ [®] ン細粒分包2g (2g/包)	通常採用
65 解毒薬	チオ硫酸ナトリウム	通常採用
65 解毒薬	デ [®] トキソール静注液2g 10%20mL	通常採用
65 解毒薬	ノボ [®] ・硫酸プロタミン静注用100mg (100mg/10ml/V)	通常採用
65 解毒薬	ハ [®] ム静注500mg 2.5%20mL	通常採用
65 解毒薬	乾燥はぶ [®] マ抗毒素各6,000単位入 (溶解液付)	通常採用
65 解毒薬	薬用炭	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
66 その他	0.025%カプサイシン軟膏(院内約束製剤)	院内採用
66 その他	0.2%ヒオクタン液(院内約束製剤)	院内採用
66 その他	1.5%酢酸(院内約束製剤)	通常採用
66 その他	イソペンP坐薬(院内約束製剤)	通常採用
66 その他	インジコカルミン注20mg「第一三共」0.4%5mL	通常採用
66 その他	インスパイアース	通常採用
66 その他	エトペン注射液0.15mg	通常採用
66 その他	エトペン注射液0.3mg	通常採用
66 その他	オリブ油(健栄)	通常採用
66 その他	カプセル	通常採用
66 その他	グリセリン(500ml/本)	通常採用
66 その他	サス力錠15mg	通常採用
66 その他	サンケンリン食	通常採用
66 その他	ソルベース	通常採用
66 その他	タルク	通常採用
66 その他	トレーランG液75g 225mL	通常採用
66 その他	ハッカ油	通常採用
66 その他	ハレシヨテンフン「ホエイ」	通常採用
66 その他	フラザキカプセル110mg	通常採用
66 その他	フラザキカプセル75mg	通常採用
66 その他	ボンワックス(2.5g/チューブ)	通常採用
66 その他	ホスコS-55	通常採用
66 その他	ホスレノールチュアフル錠250mg	通常採用
66 その他	ホスレノールチュアフル錠500mg	通常採用
66 その他	ホスレノール顆粒分包250mg	通常採用
66 その他	ホスレノール顆粒分包500mg	通常採用
66 その他	ミンクリア内用散布液0.8% 20mL	通常採用
66 その他	ヨウ素	通常採用
66 その他	リリカプセル150mg	通常採用
66 その他	リリカプセル25mg	通常採用
66 その他	リリカプセル75mg	通常採用
66 その他	リルテック錠50 50mg	通常採用
66 その他	レナジェル錠 250mg	通常採用
66 その他	レミチカプセル2.5μg	通常採用
66 その他	塩化ナトリウム	通常採用
66 その他	耳垢水(ていねい水 院内約束製剤)	通常採用
66 その他	酢酸(健栄)	通常採用
66 その他	大塚蒸留水 500mL	通常採用
66 その他	単シロップ(健栄)	通常採用
66 その他	注射用水 20ml	通常採用
66 その他	注射用水 500mL	通常採用
66 その他	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	通常採用
66 その他	内視鏡用アルコール液(院内約束製剤)	通常採用
66 その他	乳糖	通常採用
66 その他	墨汁パイアル	通常採用
66 その他	流動パイアル	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 藥 効 分 類 名	正 式 名 称	採 用 形 態
67 漢方薬	(501) ヲム紫雲膏	通常採用
67 漢方薬	〔東洋〕 桂枝加黄耆湯ⅠⅠⅠ細粒2g	院外採用
67 漢方薬	〔東洋〕 桂枝加葛根湯ⅠⅠⅠ細粒2g	院外採用
67 漢方薬	〔東洋〕 桂枝加厚朴杏仁湯ⅠⅠⅠ細粒2. 5g	院外採用
67 漢方薬	〔東洋〕 桂麻各半湯ⅠⅠⅠ細粒1. 5g	院外採用
67 漢方薬	JPS真武湯ⅠⅠⅠ顆粒〔調剤用〕 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	KTS胃苓湯ⅠⅠⅠ顆粒3g	院外採用
67 漢方薬	KTS釣藤散ⅠⅠⅠ顆粒2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ウチノハ味丸M 20丸	診療科限定
67 漢方薬	クシ甘草湯ⅠⅠⅠ細粒 3g	通常採用
67 漢方薬	クシ桂枝加苓朮附湯ⅠⅠⅠ細粒 2. 5g	通常採用
67 漢方薬	コロ-桔梗石膏ⅠⅠⅠ細粒2g	院外採用
67 漢方薬	コロ-九味檳榔湯ⅠⅠⅠ細粒2g	院外採用
67 漢方薬	コロ-腸癰湯ⅠⅠⅠ細粒2g	院外採用
67 漢方薬	コロ-梔子柏皮湯ⅠⅠⅠ細粒2g	院外採用
67 漢方薬	ヲム21 小半夏加茯苓湯ⅠⅠⅠ顆粒 2. 5 g	通常採用
67 漢方薬	ヲム54 抑肝散ⅠⅠⅠ顆粒 2. 5g	通常採用
67 漢方薬	ヲムきゅう帰膠艾湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 3g	院外採用
67 漢方薬	ヲムよく苡仁湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム安中散ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム越婢加朮湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム黄連解毒湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム黄連湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム黄耆建中湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 3g	院外採用
67 漢方薬	ヲム乙字湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム温経湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム温清飲ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム加味帰脾湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム加味逍遙散ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	通常採用
67 漢方薬	ヲム葛根湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	通常採用
67 漢方薬	ヲム葛根湯加川きゅう辛夷ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム甘麦大棗湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム帰脾湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム桔梗湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム牛車腎気丸ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	通常採用
67 漢方薬	ヲム啓脾湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム桂枝加竜骨牡蠣湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	通常採用
67 漢方薬	ヲム桂枝加朮附湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム桂枝加芍薬大黄湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	患者限定採用
67 漢方薬	ヲム桂枝加芍薬湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	通常採用
67 漢方薬	ヲム桂枝人参湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム桂枝湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム桂枝茯苓丸ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム桂枝茯苓丸加よく苡仁ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム荊芥連翹湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム五虎湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム五積散ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム五淋散ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム五苓散ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	通常採用
67 漢方薬	ヲム呉茱萸湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム香蘇散ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム三黄瀉心湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム三物黄ごん湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム参蘇飲ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム酸棗仁湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム四逆散ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム四君子湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム四物湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム滋陰降火湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム滋陰至宝湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 3g	院外採用
67 漢方薬	ヲム治打撲一方ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム治頭瘡一方ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム七物降下湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム柴陷湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム柴胡加竜骨牡蠣湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用
67 漢方薬	ヲム柴胡桂枝乾姜湯ⅠⅠⅠ顆粒(医療用) 2. 5g	院外採用

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
67 漢方薬	ツム柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム柴胡清肝湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム柴朴湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	通常採用
67 漢方薬	ツム柴苓湯エキス顆粒 (医療用) 3g	院外採用
67 漢方薬	ツム十全大補湯エキス顆粒 2.5g	通常採用
67 漢方薬	ツム潤腸湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム女神散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム升麻葛根湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム小建中湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム小柴胡湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	通常採用
67 漢方薬	ツム小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム小青竜湯エキス顆粒 (医療用) 3g	通常採用
67 漢方薬	ツム消風散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム神秘湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム辛夷清肺湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム人參湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム人參養栄湯エキス顆粒 (医療用) 3g	通常採用
67 漢方薬	ツム清暑益気湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム清上防風湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム清心蓮子飲エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム清肺湯エキス顆粒 (医療用) 3g	通常採用
67 漢方薬	ツム川きゅう茶調散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム疎経活血湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム大黃牡丹皮湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム大黃甘草湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	通常採用
67 漢方薬	ツム大建中湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	通常採用
67 漢方薬	ツム大柴胡湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム大承気湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム大防風湯エキス顆粒 (医療用) 3.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム竹じょ温胆湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム猪苓湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	通常採用
67 漢方薬	ツム猪苓湯合四物湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム調胃承気湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム通導散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム釣藤散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	通常採用
67 漢方薬	ツム桃核承気湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム当帰飲子エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム当帰建中湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム当帰湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	通常採用
67 漢方薬	ツム二陳湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム二朮湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム排膿散及湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム白虎加人參湯エキス顆粒 (医療用) 3g	院外採用
67 漢方薬	ツム麦門冬湯エキス顆粒 (医療用) 3g	通常採用
67 漢方薬	ツム八味地黄丸エキス顆粒 (医療用) 2.5g	通常採用
67 漢方薬	ツム半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	通常採用
67 漢方薬	ツム半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	通常採用
67 漢方薬	ツム平胃散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム補中益気湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	通常採用
67 漢方薬	ツム防風通聖散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム防已黃耆湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	通常採用
67 漢方薬	ツム麻杏よく甘湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム麻杏甘石湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム麻黄湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム麻黄附子細辛湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	通常採用
67 漢方薬	ツム麻子仁丸エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム木防已湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム立効散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム竜胆瀉肝湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム苓桂朮甘湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム苓姜朮甘湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム六君子湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	通常採用

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
67 漢方薬	ツム六味丸エキス顆粒(医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム炙甘草湯エキス顆粒(医療用) 3g	院外採用
67 漢方薬	ツム芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 2.5g	通常採用
67 漢方薬	ツム茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム茵陈五苓散エキス顆粒(医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム茯苓飲エキス顆粒(医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ツム茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 2.5g	院外採用
67 漢方薬	テイコク猪苓湯エキス顆粒 2.5g	院外採用
67 漢方薬	ヨクイニンエキス散「コタロー」 2g	通常採用
67 漢方薬	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	院外採用
67 漢方薬	加工ﾌﾟｼﾞ末「三和生薬」 (0.5g/包)	通常採用
67 漢方薬	三和黄ごん湯エキス細粒 2.5g	院外採用
67 漢方薬	三和葛根加朮附湯エキス細粒 2.5g	院外採用
67 漢方薬	三和桂芍知母湯エキス細粒 3g	院外採用
67 漢方薬	三和当归芍薬散加附子エキス細粒 3g	院外採用
67 漢方薬	三和附子理中湯エキス細粒 1.5g	院外採用
67 漢方薬	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒 1.5g	院外採用
67 漢方薬	小太郎漢方の炮附子末	院外採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名	正式名称	採用形態
68 造影剤	EOB-フ [®] リモ [®] スト注シリンジ [®] 18.143%10mL	通常採用
68 造影剤	イオ [®] リンシリンジ [®] 300 64.71%100mL	通常採用
68 造影剤	イオ [®] リンシリンジ [®] 350 75.49%100mL	通常採用
68 造影剤	イオメロン350注シリンジ [®] 135mL 71.44%	通常採用
68 造影剤	ウログ [®] ラフィン注60% 20mL	通常採用
68 造影剤	オムニバ [®] ーク240注10mL 51.77%	通常採用
68 造影剤	オムニバ [®] ーク300注シリンジ [®] 150mL 64.71%	通常採用
68 造影剤	ガ [®] ストログ [®] ラフィン経口・注腸用	通常採用
68 造影剤	ソナゾ [®] イド [®] 注射用16μL（溶解液付）	通常採用
68 造影剤	ピ [®] リスコビ [®] ン点滴静注50 10.55%100mL	通常採用
68 造影剤	フ [®] ロハンス静注シリンジ [®] 13mL	通常採用
68 造影剤	ホ [®] ーステル内用液10 10mg250mL	通常採用
68 造影剤	マク [®] ネ [®] スト静注シリンジ [®] 37.14%10mL	通常採用
68 造影剤	マク [®] ネ [®] スト静注シリンジ [®] 37.14%15mL	通常採用
68 造影剤	マク [®] ネ [®] スト静注シリンジ [®] 37.14%20mL	通常採用
68 造影剤	マク [®] ネ [®] スト静注シリンジ [®] 37.14%5mL	通常採用
68 造影剤	リビ [®] オト [®] ール480注10mL	通常採用

rst_採用薬品リスト

類	薬効分類名	正式名称	採用形態
69	自己血糖測定器具	G3b血糖測定電極 スマートプルー (25枚/箱)	通常採用
69	自己血糖測定器具	LFSカイクセンサ (25枚/瓶)	通常採用
69	自己血糖測定器具	イタンコ [ペン型インスリン注入器] 「ゴールド」	通常採用
69	自己血糖測定器具	イタンコ [ペン型インスリン注入器] 「ブラック」	通常採用
69	自己血糖測定器具	グルコカード マイタ イア	通常採用
69	自己血糖測定器具	タ イアセンサー (25枚/組)	通常採用
69	自己血糖測定器具	ノボペン300デミ (ライム)	通常採用
69	自己血糖測定器具	ノボペン4シルバ	通常採用
69	自己血糖測定器具	ノボペン4ブルー	通常採用
69	自己血糖測定器具	ヒューマペンラグジュラ 「HD」	通常採用
69	自己血糖測定器具	ヒューマペンラグジュラ 「ゴールド」	通常採用
69	自己血糖測定器具	ヒューマペンラグジュラ 「レット」	通常採用
69	自己血糖測定器具	フレッシュン エクシート	通常採用
69	自己血糖測定器具	ホケットランセット[青]0.8mm (25+1本/箱)	通常採用
69	自己血糖測定器具	マイクロファイブラス 31G 5mm (14本/袋)	通常採用
69	自己血糖測定器具	マルチランセットS	通常採用
69	自己血糖測定器具	マルチレット (25本/箱)	通常採用
69	自己血糖測定器具	メテリアルコットME-S (4cm×4cm/104枚)	通常採用
69	自己血糖測定器具	ワンタッチウルトラビュー	通常採用
69	自己血糖測定器具	ワンタッチペン [本体]	通常採用
69	自己血糖測定器具	ワンタッチペンランセット (25本/箱)	通常採用

rst_採用薬品リスト

類 薬効分類名		正式名称	採用形態
70	器材	タ イプスティックス (100枚)	通常採用
70	器材	ハンデ ィャー (スピ リーハ 専用吸入器)	通常採用
70	器材	ビ ークフロメーター 「スタンダート」	通常採用
70	器材	ビ ークフロメーター 「ローレンジ」	通常採用
70	器材	角綿	通常採用
70	器材	静注用フロラン専用溶解液 50mL	患者限定採用